Uebersicht der Geologie von Kolumbien.

Im NW Suedamerikas gelegen und $1\frac{1}{2}$ Million Quadratkilometer gross, ist Kolumbien im Anfang des vorigen Jahrhunderts durch Humboldts Ansichten ueber die Laengsgliederung, Verknotung und Beckenbildungen im gebirgigen Teil sowie durch seine u. Degenhardts Fossilsammlungen von allgemeinerem Interesse fuer Europa gewesen. Seine Sammlungen wurden spaeter durch Boussingault ergaentz, aber erst um die sechziger Jahre fuehrte Karsten seine 12 jaehrigen Forschungen in Venezuela, Kolumbien und Ekuador aus, denen wir die erste ~~gute~~^{nuetzliche} stratigraphische Grundlage und eine rudimentaere geologische Karte des NW Suedamerikas verdanken. Hettners wertvolle, systematische Arbeit ueber die Ostkordillere folgte 1892 und kurz vorher erschienen die Arbeiten Sievers ueber das nord-oestliche Kolumbien. Um diese Zeit legten Siever's, und Reiss, und Stuebel's Gesteinsammlungen die Grundlage zu den grossen petrographischen Arbeiten von Bergt, die auch heute bei der Vielseitigkeit der Gesteine von grossem Nutzen ~~ist~~^{sind}. Kuech bearbeitete aus dem Material von Reiss und Stuebel die jungvulkanischen Gesteine. 1907 gab Stille seine Beobachtungen ueber die Geologie von Kolumbien unter Zugrundelegung der Laengsgliederung des Landes bekannt, die die Grundlage zu der systematischen Entzifferung der Geologie des Landes bilden. Tulio Ospina (1911) machte die Gliederung von Westkolumbien, speziell in Antioquia bekannt und erkannte die Bedeutung der Zentralkordillere als Orogen-u. Entwicklungsachse. R. Scheibe, der Begruender der staatlichen geologischen Untersuchungen in Kolumbien, gab wichtige Beitrage zur Gliederung der Stratigraphie in der Gegend von Bogotá und am oberer Magdalena, jedoch ist seine wichtigste Arbeit die ueber Antioquien, der eine geologische Karte beigegeben ist. Eugster gab eine ~~sehr~~ treffende Uebersicht ueber die Spezialtektonik der Ostkordillere und Aufklaerung ueber die Stratigraphie in der Zone von Bogotá, des Carare-Beckens u. des Westhanges des Ocaña Massivs. Neben Alfred Beck und Werenfels legte F. M. Anderson die Grundlage zur Stratigraphie im Tertiaer von Nordkolumbien. 1926 veroeffentlichte Grosse die erste Einzelkartierung und Einzelbeschreibung eines Gebietes von Kolumbien, des antioquischen Abschnittes der Cauca-Senke. Ihr folgten die Aufnahmen im Quellgebiet des Magdalena und Caquetá und im Departament Nariño. Stutzers Untersuchungen sind hauptsaechlich beschreibender Art und beziehen sich auf Teile des gesamten Orogens, insbesondere auf die Ostkordillere und die Magdalenen-Senke. E. A. Scheibe's Arbeiten ueber Kolumbien kommen erst jetzt zur Veroeffentlichung; die von ihm stratigraphisch gesammelten Ammoniten der Kreide sind von Riedel bestimmt worden und bil-

den die Unterlagen des ersten veröffentlichten Heftes. Wichtige paläontologische Beiträge über die Kreide von Ostkolumbien hat O. Dietrich veröffentlicht und werden zur Zeit durch Breistoffer und Basse durchgeführt. - de Boeckh und Mitarbeiter haben über die Küstenskette und die pazifische Senke ein wichtiges Profil bekannt gegeben, ebenso über die Linie vom Carare-Becken zum Santander Massiv; de Boeckh ist die erstmalige Kenntnis der Silurfossilien in Kolumbien zu verdanken. An Hand der vorhandenen Unterlagen hat de Cizancourt eine sehr ansprechende Ansicht über die tektonischen Grundzüge des Landes entworfen. In gedrängter Übersicht gibt Wheeler die komplizierten stratigraphischen Verhältnisse in einem Tertiär-Becken des Landes, dem des Carare, bekannt, gestützt auf Pilsbry's paläontologischen Bestimmungen der Suess- u. Brackwasserfauna. Wichtige Hinweise auf die Geologie von Kolumbien geben Olsson, King und Notestein in Schucherts Werk über die Antillen-Kariben-Region. W. Kehrler hat zunächst das Oberkarbon im Bereich des Quetame-Knotens untersucht und darauf eine Ammonitenzonen-gliederung der Kreide östlich von Bogotá bekannt gegeben. Verf. hat speziell die Westhälfte der Virgation der Westkordillere (Urabá), dann den Abschnitt der Cauca-Senke in den Departamenten Cauca u. Valle, das obere Magdalenaental und die Ostkordillere im Bereich von Cundinamarca, Boyacá und Nordsantander untersucht und allgemein die Küstengebiete des Pazifiks und andere Teile des Landes.

Die Arbeiten in den Nachbarländern, die für die Geologie von Kolumbien von besonderem Einfluss sind, sind folgende. Für den Nordosten (Santa Marta Massiv, Goajira-Halbinsel) sind die von K. Martin ausgehenden Arbeiten über Aruba und Curacao wichtig, weil sie ^{vom petrographischen Standpunkt aus} einen klaren evolutiven Zusammenhang zwischen den genannten Inseln und dem Kontinent aufdecken. Allgemeine Bedeutung für Ostkolumbien hat Liddle's Arbeit über Venezuela, spezielle haben die Arbeiten von Hedberg und L. Kehrler über die W-Seite des Maracaibo-Beckens, bzw. über die Zone von San Cristobal. Ebenso sind die Arbeiten von Steinmann über Peru und die von Th. Wolf über Ecuador für Kolumbien sehr erläuternd. Der allgemeine Zusammenhang von Kolumbien mit Suedamerika bzw. Zentralamerika wird durch die Arbeiten von Gerth und Schuchert dargestellt. Schucherts Arbeit, in dem Panamá betreffenden Teil, ist grundlegend für die Erforschung der Küstenskette und des pazifischen Küstentreifens.

Durch die genannten Untersuchungen und die Beziehungen zu den Nachbarländern ist eine allgemeine Kenntnis der Geologie des orogenen Teils von Kolumbien, speziell des östlich der Zentralkordillere liegenden Teils (erzielt worden. Die grosse Grasebene des Ostens ~~(Llanos)~~ (Llanos) scheint durchweg von Quartaer bedeckt und direkten geologischen Untersuchungen entzogen zu sein; nach Sueden geht sie in eine waldbedeckte, z.T. tafelige Niederung ueber, die durch v. Bauers Untersuchungen allgemeiner bekannt geworden ist.

Das allgemeine Ergebnis der Untersuchungen besteht darin, dass die Geologie des Landes eng an die Laengsgliederung des Landes und an ihre Eigentuemlichkeiten gebunden ist.

Morphologie und Tektonik.

Die heutige Kenntnis zeigt, dass Kolumbienein ^{unduliertes} ausgesprochenes, ✓
Faltenland ist und dass auch die Entwicklung waehrend des Mesozoikums und des Tertiaers ein von epirogen zu orogen verlaufender Faltenvorgang ist. Eugster hat die Tektonik der Ostkordillere und des östlich Magdalenensenke mit der des Schweizer Jura verglichen, de Boeckh mit Gignoux's Ansicht ueber den jurassischen Zustand der ^{Schweizer} Alpen.

Die Ueberschiebungen sind in dem tektonisch weniger stark in Anspruch genommenen Osten des Landes (östlich der Kinne der Zentralkordillere) weniger haeufig als im Westen, der von einer intensiven Tektonik betroffen worden ist.

Das Typische an der Oberflächengestaltung Kolumbiens ist die Laengsteilung. Sie kommt allgemein zum Ausdruck durch die Folge von W nach E:

Orogen - Vorlandebene - Guayana-Kraton.

Das Orogen ~~virgiert~~ ⁹⁸ kelchartig von Ekuador nach dem Karibischen Meer und zwar nimmt von etwa 200 km Breite in Ekuador auf ueber 700 km Breite im Norden zu. Im selben Maasse verbreitern sich die Gebirgsaeste, Es handelt sich um die kolumbische Virgation der Anden.

Die vom Orogen scharf abgesetzte Vorlandebene zerfaellt in eine noerdliche ^{Savanne} Ebene, die Llanos, welche sich nach Venezuela fortsetzen und eine suedliche ^{waldige} Tafelebene, hier Putumayo-Platte genannt. Letztere bringt nach v. Bauer die Gesteine des Guayana-Kratons in die Naeh des Orogens u. kann als flach abtauchender Vorsprung desselben aufgefasst werden (s. Cizancourt); es ist von wenig maechtigen sandigen Schichten bedeckt, deren Alter zwischen Oberkreide und Alttertiaer liegt. Die Llanos selbst, nach dem Eintauchen des Tertiaers am Orogenrand u.

dem Abtauchen der alten Guayanagesteine vom Kraton und seinem suedlichen Vorsprung her zu urteilen, scheint ein weites Becken darzustellen, dessen Sedimentationstief (Ventralseite) naher am Orogen liegt.

Das Guyanakraton tritt wahrscheinlich schon westlich des Orinoko auf geringe Erstreckung zu Tage und verbreitert sich ueber Tage in der Inselberglandschaft von Bauers, die den oestlichen Teil von Kolumbis bisch Amazonien umfasst.

Morphologisch und tektonisch stellt das Orogen ein Antiklinorium dar, das aus drei Kordilleren, die in sich mindere Antiklinorien darstellen, und zwei interandine Senken besteht, die Synklinorien sind. Die Laengsunterteilung von W nach E ist folgende:

West Kordillere-Cauca-Senke-Zentral Kordillere-Magdalenen-Senke-Ost Kordillere

Westlich der Westkordillere tritt noch ein Stuack der Kuestenkordillere in der Pazifik-Senke in Erscheinung, jedoch scheint es von anderen Gesichtspunkten angebracht, diese ^{Glieder} als aufgefaltete Teile eines westlichen Vorlandes anzusehen. u.A. ist die Kuestenkette kein Glied von der Bedeutung einer Kordillere und die ^{grosse} Tertiaerdecke, die fuer das Ostvorland gegenueber dem Orogen typisch ist, dehnt sich hier vom Westfuss der Westkordillere an nach dem Pazifik aus; auch das Ostvorland zeigt gelegentliche Auffaltung, z.B. im Baül von Venezuela.

Zentral-Kordillere.

Typisch fuer diesen ^{stark von Granit u. Diorit durchsetzten} Andenast sind die metamopphen Sedimente, die ^{grossenteils} praemesozoisch, z.T. aber auch mesozoisch sind (metamorphe Kreide im Sueden). Desgleichen ist typisch fuer dies Glied, dass es seit der Kreide als Achse des Vulkanismus und als Entwicklungsscheide zwischen den Gesteinen oestlich und westlich wirkt. Heute stellt es auf grosse Erstreckung die Gebirgsachse dar, die eine Unterteilung in Westkolumbien und Ostkolumbien zulaesst; die Kinne der Zentralkordillere deutet den Verlauf der Achse an. Diese Bestimmungen gehen von Tulio Ospina aus; sie sind entscheidend fuer eine natuerliche Bestimmung der Geologie von Kolumbien.

Die morphologischen Verhaeltnisse der Zentralkordillere sind unzureichend fuer ihre Bestimmung; die Erstreckung des Kristallin gibt deutlichere Hinweise, aber ~~auch~~ dieses ist lokal bedeckt. Streckenweise muss man daher provisorische Abgrenzungen annehmen. Ausser vulkanischen Relikten, hat die Zentralkordillere keine tertiaeren Sedimente; die Kreide, wo vorhanden, ist metamorph.

Von ~~hier~~ kommend, wo sic

Von Ekuador kommend, wo sie Ostkordillere genannt wird, faellt die Zentralkordillere zunaechst nach dem Quellgebiet des Magdalena u. Cauca ab; ihre tiefste Depression liegt SE vom Vulkan Puracé auf 3000 bis 3100 m. Auch geologisch kann hier eine Depression vermutet werden, da die Kreide von W u. E an ihre Kimme herantritt; sie ist von der Quelle des Magdalena bis zum Schneesulkan des Huila bekannt. Eine aehnliche morphologisch-geologische Depression liegt suedlich der ekuatorianischen Kulmination, am Marañon Knie, wo das Mesozoikum von Westperú mit dem von Ostperú verbunden ist. -Noerdlich der Depression ~~vom~~ Puracé steigt die Kordillere auf eine mittlere Hoehe von 3800 m und erhaelt sich auf diesem Niveau bis Suedantioquia (Sonson), ausgenommen in der schmalen Zone des Quindio-Passes, der ein Erosionseinschnitt zu sein scheint. Von Sonson ab verbreitert sich die Kordillere bedeutend und faellt zu der ~~Kump~~ Depression von Remedios ab, deren breiter oestlicher Teil noch den Charakter einer vorobertertiaeren u. vielleicht vorkretazischen Rumpfflaeche wahrt. Staerker geneigt, laesst sich diese Rumpfflaeche auf der Ostseite ^{nach Süden} bis zur Zone von Honda am ~~oberen~~ Magdalena verfolgen. Auf die Remedios-Depression folgt auf der Ostseite ein ausgesprochenes Massiv, das von San Lucas, das bis 3000 m Hoehe ansteigt, waehrend westlich davon das Gelaende der Zentralkordillere sich veraestelt und in Richtung nach der Caucamuendung untertaucht. Die kleinen Inselberge am Nordabfall des San Lucas Massivs, die in Richtung der Inselberge von *Chimichagua* am N Ende der Ciénaga de Zapatosa deuten, ausserdem die Spur der Banco-Porphyrite (Weiske) und Faziesbeziehungen von Gesteinen verweisen deutlich darauf, dass die Zentralkordillere zwischen Banco und Mompox eine starke Depression erleidet (Mompox-Depression) und dann in der Sierra Nevada de Santa Marta ^{deren Kristallin dem der Zentralkordillere gleicht.} wieder ansteigt. Nach den Untersuchungen Stutzers kann man annehmen, dass ein oestlicher Ast der Zentralkordillere in der Goagira wieder eine niedere Kulmination aufweist und dann ~~zwischen~~ in Aruba u. Curacao wieder auftaucht, gemaess den auf K. Martin und Sievers ~~angestellten~~ zurueckgehenden Gesteinsbeziehungen zwischen dem Santa Marta Massiv und den hollaendischen Inseln. Der Nachweis von Kreide am Nordhang durch Karsten (Palomino) und Sievers koennte auf eine Virgation der Zentralkordillere ~~mauten~~ gegen das Karibische Meer deuten. Ein schwieriges Problem ist die Abgrenzung der Westseite der Zentralkordillere, da das Gelaende von einer jungen, gleichfoermigen Ebene eingenommen wird. Wie ist auf der Karte geomorphologisch gezogen.

Der geschilderte Verlauf zeigt die Undulationen, ^{der} Zentralkordillere:

- 1) Massiv (Kulminationszone) von Ekuador
- 2) Depression des Puracé (auch geologisch)
- 3) Massiv von Hüllá-Antioquia
- 4) Depression von Remedios
- 5) Massiv von San Lucas
- 6) Depression von Mompox
- 7) Massiv von Santa Marta
- 8) Depression von Riohacha
- 9) Niedermassiv der Goagira und vermutlich; stark undulierte Fortsetzung nach Curaçao.

Von diesem Standpunkt aus betrachtet, kann man die Zentralkordillere als undulierte Grossantikline auffassen, die als kristalliner Zug ~~sich~~ zwischen dem Tertiaer der angrenzenden Senken des Cauca und Magdalena liegt.

Die Abrenzung der Zentralkordillere gegen die Senken, speziell gegen die Cauca Senke, zeigt starke Vorsprünge oder Promontorien des Kristallins. *Die Promontorien sind für Kolumbien typisch.* In der Zone des Patia-Beckens schiebt sich die Zentralkordillere in einem komplizierteren Promontorium vor, das noch nicht naeher bekannt ist; noerdlich folgt darauf das Promontorium von Buga Popayan, dessen Kristallin grossenteils vom gleichnamigen Hochplateau bedeckt ist. Darauf folgt zunaechst das Buga Promontorium, das nach Sueden stumpf u. nach Norden (morphologisch) gegliedert abfaellt. Die Zone von Manizales stellt vermutlich auch ein Promontorium dar, das nicht im Einzelnen bekannt ist. Bei Fredonia erweitert sich die Zentralkordillere *zu dem Ituango Promontorium* ganz bedeutend, *u. Gliederung* dessen suedliches Ende durch die Aufnahmen von R. Scheibe und E. Grosse gut bekannt geworden sind und dessen Nordabfall in einem Ast wahrscheinlich bis zur Serranie von Ayapel und in einem anderen Ast gegen Cáceres abfaellt. Da eine regelmaessige *dieser Kordillere* Aufeinanderfolge von Promontorien am Westrand zu beobachten ist, wurde auf der tektonischen Karte ein Promontorium auf der Westseite des Santa Marta Massivs angedeutet. - Auf der Ostseite sind die Promontorien weniger ausgesprochen. Ein bedeutendes dieser Art erhebt sich suedlich des Saldaña Flusses, das gegen den Paez-Fluss und gegen Coyaima abfaellt. Westlich von Coyaima wird es durch eine tief nach Sueden reichende kretazisch tertiaere Bucht eingeschnitten (Stilles Coyaima-Bucht). Nach kleineren Vorspruengen bis noerdlich Puerto Berrio, kann *man der* Lage des Massivs auf der Ostseite gemaess annehmen, dass das San Lucas Massiv eigentlich ein Grosspromontorium der Zentralkordillere sei.

Eine eigentliche Laengsteilung der ~~Zentralkordillere~~ weist die alte Orogenachse nicht auf, ausgenommen in ihrem Abfall gegen den unteren Cauca, wo eine noch nicht naeher gepruefte Veraestelung stattfindet. Eine allgemeine Laengsteilung ist vielleicht durch dem Umstand angedeutet, dass die Westseite (vermutliches metamorphes Mesozoikum) schmaeler und staerker eingeschnitten als die Ostseite (vorwaltendes Palaeozoikum) ist.

Magdalena-Senke

Während der Kreide war diese Senke mehr oder weniger Küstengebiet; erst im Verlaufe des Tertiärs wird sie zu dem heutigen Synklinorium, das sich zwischen Ost- und Zentralkordillere einfügt und morphologisch gut ausgeprägt ist.

Im Sueden endet die Senke scheinbar an der Wasserscheide zwischen dem Magdalena und dem Caquetá, die Humboldt als Verknotungspunkt der Ost- mit der Zentralkordillere ansah. Die Untersuchungen von Grosse deuten jedoch darauf, dass es sich um eine geologische Schwelle handelt, in der die Falten der ~~Magdalenen~~ **senke** aufsteigen und dann gegen den oberen Putumayo abfallen. Nach den Untersuchungen der amerikanischen Geologen auf der Ostseite der Anden von Ekuador und Perú zu urteilen, setzt die Senke suedlich der ~~Schwelle~~ genannten (San Agustin-) Schwelle nicht mehr fort, sondern kann dort den Charakter eines sedimentären Küstengebietes im Bereich des kretazisch-tertiären ostandinen Beckens bewahren, den sie während der Kreide im kolumbischen Teil inne hatte.

Noerdlich der San Agustin-Schwelle entwickelt sich zunächst ein langgezogenes, komplexes Becken, das man allgemein als Neiva-Becken bezeichnen kann. Es wird noerdlich durch den Saldaña Vorsprung der Zentral-Kordillere und den Doche Vorsprung der Ostkordillere eingengt, sodass nur eine schmale ^{tertiärer} Kanal, die Enge von Golondrinas, die Verbindung mit dem folgenden, besser ausgeprägteren und kleineren Guamo-Becken herstellt. Letzteres Becken wird nach Norden durch das NE streichende Antiklinorium (Bruecke) von Gualanday begrenzt. Ab dieser Bruecke nimmt die Magdalenen Senke eine einfachere Gestalt an; westlich des Magdalena Flusses wird sie tafelig-eben und dann eben, während oestlich zunächst noch bergiges Gelaende und dann Ebenen und Huegel die Senke umfassen. Geologisch betrachtet, bildet sich unterhalb der Gualanday-Bruecke zunächst das Honda Becken, dessen Zentrum oestlich Cambao liegen mag. Nach Norden leitet die Enge von La Dorada nach dem ~~weiten~~ Carare Becken, in dem die Senke eine starke Erweiterung zuungunsten der Ostkordillere erleidet, und das durch einen von den Quinchas-Bergen der Ostkordillere gegen den Carare Fluss vordringenden Sporn eine auffallende Teilung ~~in Sueden~~ aufweist. Auf dieses Becken folgt die Enge von Simití, deren Tiefachse gegen den Rand des Ozaña-Massivs verläuft. Dem oben angedeuteten Verlauf der Zentralkordillere nach dem Massiv von Santa Marta und dem Verlauf der Ostkordillere entsprechend, verlässt nun die Magdalenen Senke das Tal des Flusses und verläuft in Richtung des Cesar-Tals, dessen Verhae

Kaeltrise 211. D. 10. 1. 1922

Verhältnisse ein Becken andeuten, das aber vom geologischen Standpunkt aus kompliziert sein kann. Es wird nach Norden durch die Schwelle an der Wasserscheide Rancheria-Cesar abgegrenzt, die vermutlich wie die von San Agustín durch ein Aufsteigen der Magdalenen-Senke verursacht wird. ^{Sievers sah hier eine Verbindung der Perija mit dem Sta. Marta Massiv.} Man kann annehmen, dass ~~hier~~ die Senke sich östlich dieser Schwelle zu einem Becken im Golf von Venezuela (Paraguaná-Becken) fortsetzt.

Während die Grossantikline oder das Antiklinorium der Zentralkordillere in Massive und Depressionen unduliert wird, erkennt man an dieser Senke eine Wellung in Becken, Schwellen (und Engen):

- 1) Schwelle von San Agustín
- 2) Becken von Neiva
- 3) Enge von Golondrinas
- 4) Becken von Guamo
- 5) Brücke (Querschwelle) von Gualanday
- 6) Becken von Honda
- 7) Enge von La Dorada
- 8) Becken vom Carare
- 9) Enge von Simití
- 10) Becken des Cesar
- 11) Schwelle des Rancheria
- 12) ? Becken von Paraguaná

Die Abtrennung der Magdalenen-Senke von den angrenzenden Kordilleren ist z. T. morphologisch gegeben, muss aber vielerorts geologisch durch die Grenze von Alttertiär zu Kreide und Kristallin erganzt werden. Die Verhältnisse im südlich der Gualanday-Brücke und im Cesar Gebiet bringen es mit sich, dass man z. T. die Kreide, z. T. ältere Formationen vorläufig in die Senke einbeziehen muss. Das Vordringen der Magdalenen-Senke gegen die Zentralkordillere findet vor allem südlich und nördlich des Saldaña Promontoriums statt. Auf der Ostseite erweitert sie sich hauptsächlich im Carare-Becken, während zwischen der Gualanday-Brücke und Neiva ein kleineres buchtenartiges Eingreifen des Tertiärs in den Rand der Ostkordillere stattfindet (s. tektonische Karte). Ostkordillere.

Die Ostkordillere stellt das innere archipelartige Gebiet des östlich der Zentralkordillere liegenden Teils der ~~zentralen~~ Geosynkline der Kreidezeit dar. Ihre eigentliche Auffaltung zu einem hohen Gebirge erfolgt offenbar erst spät im Tertiär u. so erklärt es sich, dass nicht bloss die Kreide-, sondern auch noch die Tertiärdecke weitgehend erhalten ist, mit Ausnahme der Massive, die nur sekundär in das Sedimentationsbereich einbezogen worden sind.

Die Ostkordillere ist im allgemeinen und im speziellen eine sehr stark unduliertes Antiklinorium, das am oberen Caquetá aufsteigt, sich gegen das Maracaibo Becken zu grosser Breite entwickelt und dann die Tendenz zeigt nach Ostvenezuela abzufallen. Den starken Undulationen seiner Ketten, der Bildung von Becken in seinem Innern und den starken Schwankungen in der Breite ist es zuzuschreiben, dass häufig Glieder von ihm abgetrennt und als selbststaendige Gebilde hingestellt werden, z. B. das Massiv von Mérida ("Andes Venezolanos").

Als schmale, undulierende Kette verlauft es im Osten des Departaments Huila, um dann im Páramo de Sumapaz ~~sein~~ (4300m) seine erste bedeutende Kulmination aufzuweisen, die nach Osten steil u. nach Westen im allgemeinen flach abfaellt. Das Massiv von Sumapaz, das ~~wahrscheinlich~~ oestlich ~~der geographischen~~ ~~Kulmination~~ des Páramo de Sumapaz geologisch kulminiert, verzahnt wahrscheinlich mit dem Quetame Massiv. Nach Norden faellt es ab und wird im Inneren der Ostkordillere durch das vielgliedrige Becken von Bogotá ersetzt, dessen oestliche Umrandung durch das Quetame-Massiv gegeben ist, waehrend die stark erodierte Westflanke geologisch niedrige und kein ausgesprochenes Massiv aufweist. Die inneren Falten der Ostkordillere beginnen vom Bogotá Becken in NE Richtung anzusteigen und kulminieren in dem sehr verzweigten Massiv von Santander, um in noerdlicher Richtung ~~abzufallen~~ in das Maracaibo Becken zu tauchen, dessen suedoestliche Umrandung, das Massiv von Mérida zu grosser geologischer Hoehe aufsteigt, waehrend die westliche, ~~in Form der in die~~ ~~das~~ ~~Perijá-Serranie~~ bestimmte Begrenzung ~~in den Massiven von Ocaña und Codazzi~~ nach Osten abtaucht und nicht weiter verfolgbar ist.

allgemeine

Massiv
bei Maracaibo (Toas)

Bedeutsam fuer die Westkordillere sind die Undulationen der inneren Zuege, welche die durch Virgationen verbundene Aufeinanderfolge Sumapaz-Massiv-Bogotá Becken-Santander Massiv-Maracaibo Becken hervorbringt. Als einzige Kordillere zeigt diese auf laengere Erstreckung eine Untergliederung in 3 Antiklinorien (Serranien) und 2 Synklinorien, analog den Anden in Kolumbien. Sie tritt durch die Synklinorien des Suarez Flusses u. des Chicamocha Flusses in Erscheinung und laesst sich nach Unterbrechungen am Knoten von Santander durch Nordsantander weiterverfolgen. Sie treten z. T. auf den Profilen der Ostkordillere in Erscheinung. Das oestliche Randantiklinorium kulminiert in den Massiven von Quetame und Mérida, waehrend die geologischen Haupterhebungen des westlichen Antiklinoriums im Norden, in den Massiven von Ocaña und Codazzi ~~liegen~~. (Untermassive des Perijá Massivs) liegen.

Der Westrand der Ostkordillere ist suedlich von Neiva verhaeltnis-
maessig einfach, waehrend er noerdlich, bis zur Gualanday-Bruecke durch
Sporne gekennzeichnet ist, unter anderen den breiten Sporn von Doche.
Zwischen der genannten Bruecke un der Muendung des Rio Negro verlaeuft
die Grenze im gebirgigen Teil laengs der Grenze Tertiaer-Kreide ~~xxxx~~
und biegt dann am Suedrand des Carare Beckens nach Osten zurueck und
entwickelt sich in NNE Richtung bis an den Sogamoso Fluss, von wo ab
die Ostkordillere sich wieder verbreitert und nach Norden bis nahe
der Ciénaga de Zapotosa verlaeuft, ~~vom xxxxxx~~ (s. Notestein) und darauf
den Ostrand des Cesar Beckens bestimmt. Nach Flugbeobachtungen zu
urteilen erleidet sie eine neue Verbreiterung durch einen stumpf
abfallenden Sporn oestlich von Valledupar und verlaeuft offenbar un-
ter Spornbildungen nach Norden gegen die Montes de Oca. - Die Ostgrenze
ist ^{nur} auf geringe Erstreckung geologisch bekannt. Vom ^{oberen Cagueta} Sueden erweitert
sich die Kordillere nach Norden, insbesondere am Ostrand des Sumapaz
Massivs. Von Villavicencio verlaeuft sie an einem steilen Hang nach
Norden, um in der Zone von Medina eine weitere Verbreiterung durch
Falten zu erleiden, die aus den Llanosebene aufsteigen. Eine aehnliche
Verbreiterung ist Noerdlich des Upia Durchbruchs angedeutet. Im Gebiet
des rio Arauca trifft die Kordillere zurueck in Verband mit der De-
pression von San Cristobal und erweitert sich wieder am Mérida Massiv.

Cauca-Senke.

Die Senke liegt zwischen Zentral- und Westkordillere; sie
ist schmaeler, hoeher und meist auch morphologisch bewegter als die
Magdalenensenke. Sie war waehrend der Kreidezeit die Westkueste der
Zentralkordillere, und erscheint um die Oligozaenzeit erstmalig als
synklinale Zone. Ihre Entwicklung war offenbar heftiger als die der
Magdalenensenke, worauf Vulkanismus und moegliche Diskordanzen in der
Kreide ^{u. Tertiar} und die grosse tektonische Intensitaet in den Randgebieten
deuten. Sie ist in Becken und Engen zerlegt. Das suedlichste Becken,
dessen innerer Teil blossgelegt ist, ist das des Patia, welches von
Grosse untersucht wurde. Durch die Enge von Mangó am Westrand des
Promontoriums von Popayan ist es mit dem Calibecken verbunden, das
den suedlichen, breiten Teil der Valle Ebene umfasst und im Innern
durch Quartaer eingedeckt ist. Eine weitere Enge, die von Buga, verbindet
es nach Norden mit dem Quindio-Becken, das nach den geologischen Be-
funden unter dem 1300 bis 1500 m hohen Quindio-Hochplateau liegt.
Nach Hinweisen auf die Geologie zwischen Cartago und Cali durch
E. A. Scheibe ist anzunehmen, dass noerdlich von Cartago eine weitere
Enge auftritt, die zu dem Becken von Fredonia in Suedantioquien

leitet, das von R. Scheibe und Grosse naeher bestimmt ist. Die Enge von Anzá verbindet es mit dem kleinen Becken von Sopetran, dessen Verbindung nach Norden nach Angaben von Tulio Ospina zunaechst durch eine tertiaere Enge ^{bei Sabana Larga} veranschaulicht wird, deren Erstreckung gegen den San Jorge jedoch geologisch nicht bekannt ist. Entsprechend dem Verlauf des westlichen Astes der Westkordillere in Gestalt der Serranie von San Jerónimo, ist zu vermuten, dass die Caucassenke nicht dem Cauca-Fluss folgt, der nach Tulio Ospina unterhalb von Sabana Larga bis ~~in~~ ⁱⁿ die Naeh von Cáceres in Kristallin verlaeuft, sondern sich im ~~Cocac~~ ^{San Jorge}-Tal ausbreitet und ~~maxi~~ dort, nach den Profilen von Beck und Anderson zu urteilen, ein Becken bildet. Der Auslauf der Cauca Senke, nach dem Karibischen Meer, wie er auf der tektonischen Karte dargestellt ist, ist ~~ein Hinweis auf eine~~ ^{eine Vermutung} Moeglichkeit.

Die Reihenfolge der Becken und Engen ist folgende:

- 1) Becken des Patia
- 2) Enge von Mangó
- 3) Becken von Cali
- 4) Enge von Buga
- 5) Becken vom Quindío
- 6) ? Enge von La Virginia
- 7) Becken von Fredonia
- 8) Enge von Anzá
- 9) Becken von Sopetran
- 10) ? Enge von Sabana Larga
- 11) ? Becken vom San Jorge
- 12) ?? Enge von Barranquilla

Humboldt hat auf die geographische Beckenunterteilung dieser Senke in Ekuador aufmerksam gemacht. Durch die starke jungvulkanische Eindeckung ist ^{dort} keine geologische Beweisfuehrung ~~vorlaeufig~~ nicht moeglich.

Die Ausbuchtungen der Cauca-Senke gegen die Zentralkordillere entsprechen denen der Becken. Die Westgrenze verlaeuft verhaeltnismaessig geradlinig. Vor- und Rueckspruenge gegen die Westkordillere sind verhaeltnismaessig unbedeutend.

West-Kordillere.

^{In Gegensatz zur Ostkordillere entwickelt sich die aus}
^{mesozoischen u. wenig tertiären Schichten aufgebaut.} Westkordillere ^{von Kolumbien} regelmaessiger und laesst sich durch Suedamerika nach Patagonien durchverfolgen, eine Tatsache, auf die schon in der spanischen Koloniallitteratur aufmerksam gemacht wird (Fidalgo). Sie ist ausserordentlich stark durch die Erosion eingeschnitten und ~~ist~~ daher wenig bewohnt u. geologisch nur allgemein bekannt. "aehrend der Kreide und ~~vermutlich~~ vorher war sie das Geosynklinalinnere des westlich der Zentralkordillere sich ausdehnenden Teiles des andinen

Geosynklinalraums. Ihre Herausbildung als Kordillere ist seit dem Oligozän bekannt.

Wie die uebrigen Kordilleren verbreitert sich auch die Westkordillere von Sueden nach Norden, aber langsamer, so dass eine groessere Breite erst zwischen 6. und 7. Grad N Breite erzielt wird, wo eine groessere Kulminationszone, das Massiv von Frontino entsteht. Dieses faellt ^(Virgation von Urabá) virgativ nach Norden ab und die mesozoischen Schichten der Kordillere werden durch Tertiaer eingedeckt, bis auf geringe, durch Anderson bekannt gewordene Ausbisse im noerdlichen Teil der San Jerónimo Serranie ^{v. Solche der W-Seite des Golfs von Urabá.}. Die Virgation vollzieht sich nach der schon fuer die Anden Kolumbiens und fuer die Ostkordillere angegebenen Unterteilung in 3 Antklinorien und zwei Synklinorien. Das oestliche Antiklinorium ist die von Beck und Anderson beschriebene Serrania de San Jerónimo. Westlich folgt zunaechst das ~~steile~~ geologisch kaum von der Serranie abgesetzte Synklinorium des Sinú, das eine Ebene darstellt, aber tektonisch stark zusammengepresst ist. Die nach W folgende Abibe-Serranie ist das zentrale Antiklinorium der Virgation dessen steile und haeufig ueberschobene Falten sich erst gegen die Kueste von Urabá weiten, und einer Untervirgation der Serranie Platz machen, in der die Fluegel steil stehen und das Innere flachere Falten aufweist. Die westlich der Abibe Serranie gelegene Leon Senke, die zum Golf von Urabá weiterleitet, ist von Quartaer bedeckt, sodass ihr geologischer Charakter nicht erkennbar ist. Ihre westliche Begrenzung ist infolge einer starken Depression, welche die westliche Serranie der Westkordillere auf ihrem Verlauf zur Serranie von Panamá erleidet, undeutlich. Jedoch ist der Verlauf der westlichen Serranie oestlich des unteren Atrato durch die dioritische Loma del Cuchillo, ^{bei Sautatá (unt. Atrato)} durch das SW Streichen der panamensischen Serranie und die NW Richtung des Gebirges suedlich des Unterlaufes des rio Sucio angedeutet. Diese Depression der westlichen Serranie gibt dem Atrato Gelegenheit, die westlich der Westkordillere gelegene Pazifik Senke (Olsson's Bolivar geosyncline) in Richtung zum Golf von Urabá zu verlassen, statt der tektonischen Linie zum Tuyra zu folgen. Olsson nimmt an, dass die Bolivar Geosyncline (s. unter Schuchert) ueber den unteren Atrato zum karibischen Gebiet leite, aber die geologische Skizze von Panamá, (Terry), die Linie Loma del Cuchillo-Sautatá und die stratigraphischen und Faziesbeziehungen zwischen dem Napipi-Gebiet und dem Tuyra-Gebiet zeigen an, dass die Bolivar Geosyncline (Pazifik Senke) in Richtung zu Schuchert's Tuyra Becken verlauft, und dass die Wasserscheide Tuyra-Atrato eine Aufwoelbung der Falten

Atrato eine Aufwölbung der Bolivar Geosynklinal-Falten ist, also eine Schwelle im Sinne der von San Agustín, die als Wasserscheide zwischen dem Magdalena und dem Caquetá fungiert.

Suedlich des Frontino Massivs kann man keine grösseren Massive, geschweige denn Becken erkennen; dies ist offenbar die Folge der ausserordentlich starken Zusammenfaltung, welche die Westkordillere erfahren hat. Kleinere Massive reihen sich auf der Ostflanke von der Gegend von Anserma Nuevo, westlich von Cartago, bis suedlich Cali. Bemerkenswert ist, dass die geographische und die geologische Kammlinie der Westkordillere hauptsächlich auf der Westflanke liegt; am Knoten von Frontino scheint sie mehr in das Innere zu rücken, während zwischen Cali und dem Patia der geologische Kamm eine Strecke lang auf der Westflanke verläuft.

Die verhältnismässig einformig verlaufende Ostgrenze der Westkordillere weist einige kleine Vorsprünge zwischen dem Patia-Becken und Cali auf. Bei Cali selbst steigen die tertiären Falten der westlichen Umrandung der Cauca Senke nach Norden auf und werden schon nördlich von Yumbo von der vulkanischen Kreide gebildet. Es ist wahrscheinlich, dass im weiteren Verlauf nach Norden die Grenze der Westkordillere östlicher verläuft als es zunächst durch die Quartärbedeckung den Anschein hat. — Die Westgrenze dieser Kordillere ist wenig erforscht. Nach den Angaben von E. White Uribe findet eine stärkere Einbuchtung suedlich von Quibdó statt, wo auch das Tertiär weiter als gewöhnlich von der pazifischen Seite in die Westkordillere eindringt. Nach den geographischen Arbeiten dieses Autors und Codázzis zu schliessen, weist die Westkordillere eine stark ausgeprägte Längsgliederung auf, die sich geologisch in der Virgation von Orabá sehr ausgeprägt ist.

Hinweise auf die Pazifische Senke und die Küstenkordillere.

Die Pazifische Senke, deren Verlauf westlich der Westkordillere sich von Paita in NW Perú (und suedlicher) gegen den Golf von Panamá verfolgen lässt, ist weithin von stark transgressivem Jungtertiär und von Quartär bedeckt, sodass ihre geologische Unterteilung nur gelegentlich erfassbar ist. Hinzu kommt, dass die Küstenkette suedlich von Cabo Corrientes in das Meer taucht und erst auf der Insel Gorgona wieder erkenntlich wird; dadurch ist die Westbegrenzung der Pazifik Senke häufig undeutlich. — Wie schon erwähnt weist diese Senke im Verlauf vom Atrato zum Tuyra die Darien Schwelle auf. Gleichfalls mag die sogenannte "Cordillera" de Colonche bei Guayaquil eine Schwelle sein (s. Wolf). Die Einengung der Pazifik Senke auf der Breite von Cabo Solano-Cabo Corrientes

Corrientes-Solano deutet darauf hin, dass zwischen dieser Enge und der Darien-Schwelle ein Becken liegt (Truandó-Becken). Aus Panamá hat Schuchert das Tuyra Becken bekannt gemacht.

Die Kuestenkette weist ein allgemeines Massiv zwischen Cabo Corrientes und dem Panamá Golf auf, das nach den derzeitigen Kenntnissen aus z.T. metamorpher Kreide, teilweise vulkanischem Alttertiaer und aus Gabbro und Basalten besteht, zu denen nach Panamá andesitische Gesteine kommen. Dies Baudó Massiv wird untergeteilt in das altandesitische Aspavé Massiv, das an der Grenze gegen Panamá liegt, und in das Solano Massiv, das bis etwa 2000 m ansteigt und nur auf der Westseite bekannt ist. - Bei Cabo Corrientes taucht das Baudó Massiv in suedlicher Richtung und seine typischen Gesteine (kontaktmetamorphes Cabo Corrientes, Gabbro, Ultrabase und Alttertiaer) erscheinen erst auf der Gorgona Insel wieder. Man kann annehmen, dass zwischen dieser Insel und Cabo Corrientes die Kuestenkette ^{V 0 2 2} durch eine starke Depression betroffen wird.

Unterteilung der Schichten von Miller, J. (1907) (1908)

Stratigraphie. ^{der Stratigraphie}
Die Unterteilung von Kolumbien beruht hauptsächlich auf lithologischen Gesichtspunkten, weil viele der Gruppen und Formationen keine kennzeichnenden Fossilien enthalten, z.T. auch, weil der palaeontologischen Bestimmung ~~sehr~~ ^{Breistofffer} grosse Schwierigkeiten im Wege gestanden haben. Durch neuere Arbeiten (Dietrich, Riedel, W. Kehrer) ist die reiche Kreidefauna von Ostkolumbien (Oestlich der Zentralkordillere) in Beziehung zur Stratigraphie besser bekannt geworden, ebenso die marine tertiaere Fauna im Norden durch Anderson, Olsson u.a. und die limnisch-brackische ~~fauna~~ des mittleren Magdalena durch Pilsbry.

Um die lithologische Unterteilung zu unterbauen, wird hier besonders darauf geachtet, dass die stratigraphische Entwicklung der Laengsgliederung des Landes und ihren Undulationen in sehr guenstiger Weise zu folgen scheint und zwar seit mindestens der Kreidezeit. Von besonderer Bedeutung sind die Becken als Subsidenzgebiete und die Massive als alte Landgebiete. Eine ueberragende Stellung nimmt die Zentralkordillere deswegen ein, weil sie zwischen einer westlichen und einer oestlichen Fazies der Gesteine als Scheidegrenze auftritt.

Praemesozoisches Grundgebirge.

Es handelt sich im allgemeinen um metamorphe Gesteine, deren Altersbestimmung und deren Abtrennung vom metamorphen Mesozikum meist unmöglich ist. Putumayo-Platte in Amazonisch Kolumbien.

Nach v. Bauer besteht der oestliche Teil dieser Platte aus den typischen Gesteinen des Guayana Kratons, d.h. aus Gneisen, die von grossen Granitmassen durchzogen sind und die als archaisch angesehen werden koennen. Gelegentlich scheinen auch Intrusionen von Nephelinsyenit vorzukommen (Ceroelle, von v. Bauer gesammelt), welche die einzigen bekannten Alkaligesteine von Kolumbien darstellen. Nach Westen werden die Guayanagesteine von transgredierenden Schichten bedeckt, welche ~~vermutlich~~ der oberen Kreide und dem Altertiaer angehoren koennen.

Ostkordillere.

Die Umwandlung der mesozoischen und im Mittel auch der der praemesozoischen Gesteine ist in der Ostkordillere weniger weit vorgeschritten als in ~~der Zentral- und der Westkordillere~~ ^{weiter westlich}. Wegen des wechselnden Grades des Metamorphismus ist es jedoch noch nicht moeglich, die metamorphen praemesozoischen Schichten der verschiedenen Gebiete miteinander zu parallelisieren.

Das praemesozoische Grundgebirge tritt speziell in den Massiven und deren Vektoren auf, d.h. im Perijá-, Santander- und Quetame-Massiv sowie in dem suedlichen Teil der Ostkordillere zwischen dem Ostseite des Sumapaz-Massivs und dem oberen Caquetá. In Venezuela ist es im Mérida Massiv waehrend der letzten Jahre naeher untersucht worden.

Das oestlich Bogotá gelegene Quetame-Massiv wird aufgebaut von:

- 1) Gachalá. ~~Oberkarbon~~ Karbon; marin, z.T. terrestrisch.
- 2) Pipiral-Schichten; Alter unsicher.
- 3) Quetame-Schichten; Alter unsicher. ? Unter Devon, ober? Silur.

Das Gachalá besteht nach W. Kehrler aus glimmrigen, z.T. phyllitischen Tonschiefern, Kalk, Sandstein und Konglomerat. Vulkanische Einlagerungen wie in Perú sind nicht vorhanden. Die ersten Fossilien, von K. Scheibe gesammelt, werden von W.E. Schmidt als Unterkarbon angesehen, eine Ansicht, die ~~durch Bestimmungen von Schuchert~~ ^{durch} ~~waher~~ von Fossilien aus derselben Gegend gestuetzt wird. Im uebrigen ist die Fauna und die Flora des Gachalá oberkarbonischen Alters.

~~R. Scheibe fand auch in Ceroellen vom Quetame-Massiv~~

Das Pipiral besteht zur Hauptsache aus phyllitischen Ton-
 schiefern, Sandsteinen und basalen konglomeratischen Sandsteinen von
 roter und gelber Farbe. An der Strasse von Villavicencio nach
 Bogotá und am Abfall des Quetame Massivs gegen den Garagoa Fluss
 kannes in konkordanten Verband mit dem Gachalá liegen und so
 vielleicht das Unterkarbon mitvertreten. W. Kehrer berichtet ueber
 Einschaltung roter Sedimente in das Gachalá. Häufig beobachtet man
 Umwandlung von Partien des Pipiral in Chloritschiefern, aehnlich
 denen des Quetame.

Das Quetame ist eine mächtige Folge von grauen, stahlblauen
 und blauvioletten Phylliten, die gegen das innere des Massivs in
 mächtige Chloritschiefer uebergehen und eine ueber 1000 m mächtige
 Sandsteinabteilung einschliessen, der graue und graphitische Phyllite
 eingeschaltet sind. Oestlich dieses Monteredondo Sandsteins finden
 sich einzelne feinkonglomeratische, grauwackenartige Sandsteinbaenke.
 Man kann vermuten, dass die von R. Scheibe gesammelten Geroelle mit
 Crinoiden, die Schmidt zum Silur oder Unterdevon rechnet, aus den Quetame
 schichten stammen.

In der Zone des Santander Massivs werden die praemesozoi-
 schen Schichten aufgebaut aus metamorphen Schieferen, Gneisen und Quar-
 ziten, die den Caribbean Series von Liddle grossenteils zu entsprechen
 scheinen. Die Umwandlung dieser Gesteine ist auf der Ostseite der
 Massivkulmination stark vorgeschritten (Strasse Málaga-Pamplona),
 waelrend auf der Westseite, z.B. in der Gegend der Mesa Rica die
 Sedimente weniger metamorph sind und Fossilfunde eher zu erwarten
 sind. Diese Westseite ist tektonisch weniger in Anspruch genommen als
 die Ostseite. Auf dem Perijá Massiv tritt das praemesozoische Grund-
 gebirge hauptsaechlich laengs der Kämme und auf der Ostseite auf,
 wo es im Norden die bekannten Devón- und Oberkarbonschichten auf-
 weist. Im kolumbischen Teil sind noch keine naeheren Untersuchungen
 ausgefuehrt. Die tektonisch stark beanspruchte Westseite des Massivs
 (s. Eugster u. Sievers) weist anscheinend kaum Ausbisse aelterer
 Sedimente auf.

Im suedlichen Teil der Ostkordillere befindet sich ein
 von Granodioriten stark durchsetztes Gneisgebiet, ^(H. Hoeck, Grosse) das nach muendli-
 chen Informationen von W. Kehrer bis Florencia im Osten reicht. Die
 Schichten werden von Grosse als archaaisch angesehen.

Magdalena-Senke.

Durch Grosse sind praemesozoische Schichten an der San Agustin Schwelle bekannt geworden. Es handelt sich um Phyllite, phyllitische Tonschiefer, Quarzite und bei Santa Rosa um metamorphe kalkige Sedimente mit unbestimmbaren Fossilresten. Grosse haelt sie fuer praekambrisch; wahrscheinlicher ist ein palaeozoisches Alter.

Zur Magdalenenen Senke gehoeren moeglicherweise noch im Nordosten die Prinoidekalken, die Stutzer von der Goagira beschreibt und Galloways Devonfossilien, die sich vielleicht auf denselben Punkt beziehen.

Zentral-Kordillere.

Die metamorphen Sedimente aus denen die Zentralkordillere hauptsaechlich besteht, werden von Bergt. u. Grosse als ~~silurisch~~ als praepalaeozoisch angesehen. Ersterer nimmt das auf Grund des Grades der Umwandlung der Gesteine wie in Deutschland an und kommt dadurch zu Schluessen, dass z.B. die Diabase, die heute als sicher der Kreide zugehoerig, in das Palaeozoikum zu stellen sind. Grosse geht von den Beobachtungen aus, dass weithin in Nordamerika, einschliesslich in den Anden, das Palaeozoikum kaum und dagegen das Praekambrium typisch metamorph sei. Er nimmt dabei Bezug auf tektonisch ruhige Gebiete, einschliesslich solcher, die im Orogen liegen. Diese Annahme kann jedoch nicht auf ein intensiv durchgefaltetes und vor allem intensiv von Intrusionen heimgesuchten Gebiet wie die Zentralkordillere und Westkolumbien gelten. R. Scheibe, dessen Erfahrungen auf dem Gebiet der metamorphen Gesteine sehr weitreichend waren, stellt die praekambrischen Tonschiefer Grosse ^{versuchsweise} in das Mesozoikum, waehrend er die metamorphen Schichten westlich von Medellin in das Palaeozoikum stellt. Seine Ansicht wird hier vertreten und ist zum Teil dadurch belegt, dass die ^{palaeozoischen} Schichten, die er als Palaeozoikum ansah und in denen er Anzeichen von Fossilien fand, westlich von Puerto Berrio die von de Boeckh festgestellten Ordovizium Fossilien enthalten. Nach den Gesichtspunkten von R. Scheibe kann man annehmen, dass die Westseite der Zentralkordillere zur Hauptsache aus metamorphen mesozoischen Schichten aufgebaut ist, waehrend die Ostseite meist palaeozoische Gesteine fuehrt. Im Einzelnen laesst sich jedoch eine Trennung nicht durchfuehren, denn es liegen z.B. am Ostrand der Zentralkordillere ^{bergneiste bis phyllitische Formationen mit Kalk und Konglomeraten,} die man zu ^{in die bei Pto. Berrio Kalkstein} den silurischen Schichten sowohl als ~~ins~~ Mesozo in die Kreide, die suedlich Ibagué sicher metamorph ist, stellen kann.

Die grosse Mannigfaltigkeit der metamorphen Sedimente, die die Zentralkordillere zusammensetzen ist ~~von~~ von Bergt, R. Scheibe, E. Grosse und O. Stutzer beschrieben. Die vorwiegenden Gesteine, soweit erkennbar, sind toniger Natur, waehrend Kalke und Sandsteine seltener auftreten. Dasselbe gilt fuer das Massiv von Santa Marta, in der Metamorphe Kalke" bisher nur suedlich von Santa Martha bekannt geworden sind.

Westkolumbien.

Nach den Gesichtspunkten von R. Scheibe, die auch durch stratigraphischen Zusammenhang gehalten werden, kann man annehmen, dass ^{in Westkolumbien westlich der Zentralkordillere} die/bekannt gewordenen metamorphen Sedimente, einschliesslich der Chita-Gruppe von Grosse vermutlich dem Mesozoikum angehoren. Dies verweist darauf, dass in dem wenig bekannten Westkolumbien das prae-mesozoische Grundgebirge wenig zu Tag tritt.

Mesozoikum.

Das Mesozoikum von Kolumbien ist in eine aeltere, ^{chronologisch} dem ~~Alter~~ ^{Alter} nach nicht definierte Abteilung, das sogenannte "Aeltere Mesozoikum" und in die Kreide untergeteilt worden. Das "Aeltere Mesozoikum" des Westens laesst sich ~~bisher nicht mit dem des Ostens verbinden~~; es wird ^{unter} Durch seine Lage, und seinen scheinbar engeren Verband mit der Kreide als solches betrachtet.

"Aelteres Mesozoikum"

Ostkolumbien. - Gironschichten ^{im Norden. - ? Marine Trias im Süden}

Hettner's Definition der Gironschichten westlich von Bucaramanga lautet: "toniger, roter, aber weiss- und teilweise auch gruengefleckter Sandstein und mit ihm violettbrauner Schiefertone und roter Kalk. ... Es ist derselbe rotgelbe Sandstein, den Karsten als eine besondere Ausbildung des Neocoms erwaelnt, und in der Tat moechte auch ich ihn, obwohl Versteinerungen fehlen, als eine durch die Nachbarschaft der kristallinischen Gesteine bedingte Faziesbildung der tieferen Lagen der unteren Kreide ansehen." - de Boeckh und Richardson erlaeuern die Gironschichten westlich Bucaramanga in einem Profil und geben deren Maechtigkeit mit ungefaehr 16000 Fuss an.

Die Definition Hettner's seiner Gironschichten ~~und~~ ^{und} den Umstand, dass Karsten ^{in dem} roten Sandstein von Urumita ^(Caesar Tal) auf den sich Hettner bezieht, gleiche Ammoniten wie bei Cáqueza (oestlich Bogotá, ^{Hauterive}) gefunden hat, haben Anlass gegeben, dem unteren Teil der Kreide von Ostkolumbien den Namen Giron zu uebertragen.

lauf des rio Paez, im südlichen Teil der Ostflanke der Zentralkordillere auftretenden Tonschiefer, Plattenschiefer, Mergel, Kalke und schwarze Lydite gehören, die in unsicherem Verbande unter der Kreide u. a. ausser Fischwirbeln und Foraminiferen keine Fossilien geliefert haben. Grosse verweist darauf dass auf geringe Entfernung südlich, bei Inzá, im Grundkonglomerat der Kreide Geroelle von schwarzen Lyditen vorkommen, die vom Schichtenverbande wie er am oberen Paez ausgebildet ist, stammen können, insbesondere, weil dort keine andere präkretazische Lyditformation dort bekannt ist. Es sei noch bemerkt, dass in der Guaduasformation zwischen Girardot und Honda, vor dem massenhaften Auftreten der typisch oberkretazischen gelben Lyditgeroellen (Basis von Gualanday) schwarze Lyditgeroelle (im Hoyon), die von Westen (Zentralkordillere) kommen, sehr häufig sind, ohne dass es möglich gewesen wäre das Muttergestein festzustellen.

Allgemein kann man sagen, dass die Ausdehnung des Giron typisch auf den nördlichen, kolumbisch-venezolanischen Teil der Ostkordillere beschränkt ist, während südlich, wo kein Giron bekannt ist, wichtige Hinweise auf marine Trias bestehen. Irgendwelche Beziehungen zwischen beiden Verbaenden sind nicht bekannt. Das typische präkretazische Giron kann als vermutlich postoberkarnoisches angesprochen werden, weil es nicht metamorph auftritt. Ob es in seinem Bereich eine einheitliche Formation darstellt ist nicht sicher, denn im Gegensatz zum sandigen Giron der Westseite des Santander Knotens ist das der Ostseite und das venezolanische mehr oder weniger stark konglomeratisch und enthaelt auf dem Páramo de Guantiva viel Geroelle von rotem Sandstein. Die roten, z.T. vulkanischen Schichten des Cesar Tals, die Sievers eingehend beschreibt und hier Camperucho-Schichten genannt werden, waeren nach Karstens Fossilangaben (Hauterive) zum Teil oder ganz ins Neoköm zu stellen.

(Litteratur: Karsten, Sievers, Hettner, Notestein u. King unter Schuchert, W. Kéhrer, Liddle, L. Kéhrer)

Westkolumbien. - Chita Gruppe

Grosse hat die Bezeichnung Chita Schichten fuer eine am Ostrand der Westkordillere in Nariño auftretende Schichtfolge gebraucht, unter der hier zusammengefasst werden:

- 1) Juratriásico (ausschliesslich vulkanische Kreide) von Tulio Ospina und R. Scheibe (Antioquia)
- 2) Rocas de Fundamento und de Transición des Verf. (Urabá) etc.
- 4) Dagua u. Espinalschichten des Verf. (von der Westkordillere in den Departamenten Valle und Cauca)
- 5) Chitaschichten von Grosse.
- 6) Barragan-Schichten des Verf. (auf der Westseite der Zentralkordillere in den Departamenten Valle und Cauca)

1) Aeltere Porphyritformation
u. Brachambrium von
Grosse (Antioquia)

Diese Schichten des westlichen Teils des Orogens liegen ^{direkt} unter der Kreide und stellen zusammen mit diesem einen Schichtenverband dar, von dem man in ^{Erweiterung} einer Angabe von R. Scheibe ueber das Juratriásico sagen kann, dass es offensichtlich einer Aera angehoert. Grosses Ansicht, dass es sich um praekambrische, bzw. (Chita) palaeozoische Schichten handelt, kann man aus den ^{pg. 16} erwahnten Gruenden nicht beipflichten, um so mehr als lokal ein und dieselbe Schichtgruppe nicht und anderwaerts metamorph sein kann. Ebenso kann man auch die ^{Alterstellung, die Verf. den Schichten in Urabá gab, nicht halten.} Die allgemeine Unterteilung geht dahin, dass der kleinere obere Teil der Gruppe - die Aeltere Porphyritformation Grosse und das Espinal - durch vulkanische Einschlaege und Lydite gekennzeichnet ist, während der untere Teil - Praekambrium und Dagua - zur Hauptsache tonig ^{ist} sind. Bezueglich der Chitaformation, die toniger und Abteilungen mit vulkanischer Einschlag hat, bemerkt Grosse, dass die von ihm gegebene Aufeinanderfolge der Abteilungen wegen Lagerungsverhaeltnissen unsicher ist.

Unter ^{im antioquischen Kartierungsgelände} Abstraktion der vulkanischen Kreide deckt sich ^{das} typische Gebiet des ~~Juratriásico mit dem~~ Praekambrium und den Karten nach auch mit der Aelteren Porphyritformation im antioquischen Aufnahmegebiet Grosses. Die aeltere Porphyritformation wird von Ospina und Scheibe nicht ausgeschieden, muss aber mit Grosse als Sonderformation angesehen werden. Da Grosse sein Praekambrium nur nach dem Grade des Metamorphismus unterteilt, wird hier die ^{unteren,} stratigraphische Beschreibung Scheibes, bezueglich des tonigen Teils des Juratriásico, die sich mehr oder weniger mit Grosse Praekambrium deckt, vorgezogen. Westlich des Cauca handelt es sich um Tonschiefer und Schiefertone mit Einlagerungen von Sandsteinen, die z.T. Arkosencharakter haben. Oestlich des Cauca wird die Schichtgruppe toniger und gleichzeitig wechselnd stark metamorph (tonschiefrig, phyllitisch und glimmerschiefrig); lokal treten Graphit- und Chloritschiefer auf. Es handelt sich nach Scheibe hauptsaechlich um Kontaktmetamorphismus. Nach R. Scheibes Aufnahmen und Tulio Ospina's Angaben dehnt sich diese einfoermige tonige Ablagerung ueber die Ostseite des Frontino Massivs und von da gegen den oberen Sinu u. San Jorge aus. Verfolgt sie nach Westen bis Dabeiba, wo sie durch Aequivalente der Aelteren Porphyritformation bedeckt wird.

Disposition des Vortrages:

Uebersicht der Geologie von Kolumbien.

- 1) Die geologische Erforschung bis heute.
- 2) Morphologie und Tektonik.
Typisches Faltenland mit ansetzenden Ueberrückungen.
 - a) Allgemeine Unterteilung des Landes in Orogen, Vorland im Osten und Guayana-Kraton; Aufteilung dieser Einheiten.
 - b) Laengsgliederung des Orogens in Kordilleren und interandine Senken; Aufteilung in Massive, Depressionen, Schwellen und Becken. Abtrennung von Laengsgliedern. - Die Bedeutung der Zentralkordillere als orogene Achse.
- 3) Stratigraphie, bezogen auf die Laengsgliederung.
Palaeontologische Kenntnis. Lithologische Unterteilung.
Entwicklungsmassive als Leitzonen. Subsidenzbecken.
 - a) Praemesozoische Ablagerungen. Fossilfunde. Auffassungen ueber das Alter der metamorphen Schichten.
 - b) Mesozoische Ablagerungen. "Aelteres Mesozoikum" und Kreide.
 - c) Tertiaer und Quartaer
- 4) Eruptivgesteine: praekretazische, kretazische und tertiaere.
- 5) Entwicklungsgeschichtlicher Ueberblick seit der Kreide; Werden der Anden in Kolumbien im Zusammenhang mit dem meso-neiden Zyklus. Zusammenhang der Entwicklung mit den Nachbarlaendern.
- 6) Eigentuemlichkeiten im Bau von Kolumbien von Kolumbien.
Faltenformen
Verteilung der tektonischen Intensitaet nach der tekt. Form u. Beziehungen zur Sedimentation und zum Magmatismus
Faltenassoziationen und Hinweise auf Symmetrie- und Aehnlichkeitsverhaeltnisse in Kolumbien und in den uebrigen Anden.

COPY 1

Morphologisch-tektonische Uebersicht.

Holm hier ist ein ausgesprochenes Faltenland, an dem Falten Ueberschiebungslinien (Längslinien) sind, das bei Vergleich mit dem Ueberschiebungslinien (Längslinien) in der Andenregion ist. Das Land umfasst im Westen die Anden und im Osten ein ebenes Vorland, das an den guayanensischen Teil des suedamerikanischen Kratons grenzt und im suedlichen Teil durch ein niederes Tafelland und nach Osten anschliessendes Inselberggebiet ersetzt wird.

Vorland, das an den guayanensischen Teil des suedamerikanischen Kratons grenzt und im suedlichen Teil durch ein niederes Tafelland und nach Osten anschliessendes Inselberggebiet ersetzt wird.

Der kolumbische Teil der Anden zeichnet sich vor den anderen Andengebieten durch seine starke Laengsteilung in Kordilleren und interandine Senken aus, an die sich die Ausbildung der Gesteinsverhaeltnisse, besonders der Stratigraphie eng anschliesst. Die grossen Laengsglieder, die hier im Virgationsraum der Anden gegen das karibische Meer auftreten, sind, wie bekannt, die folgenden:

W-Kordillere Cauca Senke Z-Kordillere Magdalena Senke E-Kordillere

zentralen Kordillere
Die von Tulio Ospina als Orogenachse (Andenrueckrat) erkannte Zentralkordillere verlaeuft von Ekuador, wo sie als Ostkordillere genannt wird, nach Norden bis 3100 m in deren Umgebung die Kreideseimente an die Wasserscheide heranreichen und so auch eine geologische alte geologische Depression andeuten. Noerdlich derselben steigt das Gelaende rasch auf eine mittlere Hoehe von 3800 m die bis zum Quindio-Pass, westlich auf der Linie Ibagué-Armenia beibehalten wird. Die hoechste Erhebung auf dieser Strecke ist der Nevado del Huila, ein erloschener Andesitvulkan der bis 5600 m ansteigen kann. Vom Quindio-Pass steigt die Zentralkordillere wieder stark an und gipfelt in der Vulkangruppe des Tolima (5500m)-Ruiz (5300m) waehrend die Wasserrscheide im allgemeinen auf 3800 bis 4000 m verbleibt. Von diesem Knotengebiet Kulminationsgebiet faellt die Zentralkordillere unter gleichzeitiger Verbreiterung gegen die flaeche und breite Depression von Remedios ab, deren Rumpfflaechencharakter morphologisch gut in Erscheinung tritt und geologisch durch die Transgression des Jungtertiaers ueber praemesozoisches Kristallin belegt ist. Waehrend im westlichen Teil der Abfall gegen die karibische Ebene verzweigt verlaeuft, hebt sich auf der Ostseite ein zu 3000 m ansteigendes Massiv, das hier San Lucas Massiv genannt wird. An seinen flachen noerdlichen Auslauf haengen sich westlich von El Banco und bei El Banco selbst kleine Inselberge in Richtung des Massivs von Santa Marta; die letzten dieser Huegel liegen bedeutend N des Magdalena Stromes bei Chimichagua, an der N Seite der Ciénaga de Zapatosa. ^{2a} auch der Faziesverlauf der Me-

landgelaende Platz macht, von dem man annehmen kann, dass es zum submarinen, durch einfache Bodengestaltung gekennzeichneten pazifischen Kraton ueberleitet.

Der antikline Charakter der Kordilleren und der synkline der Senken und der Vorlaender kommt in dem idealisierten Profil No. zum Ausdruck und ist schematisch im Profil No. wiedergegeben.

In dem genannten Zusammenhang ^{gesehen,} stellt die Zentralkordillere morphologisch, tektonisch und entwicklungsgeschichtlich eine Achse dar, welche das Orogen symmetrisch zweiteilt u. dem-gleichfalls symmetrisch das westliche u. das oestliche Vorland und darauf das pazifische, bezw. das Gondwana Kraton folgen. Die evolutive Rolle der Zentralkordillere ~~während der~~ am Ende der Kreidezeit geht aus dem Profil No. hervor.

Die Laengsunterteilung der Grossantiklinen des Orogens in Falten von der Amplitude von Kordilleren und Senken laesst sich teilweise in die naechst geringere Groessenordnung weiterverfolgen. So tritt in der Ostkordillere im Gebiete der Fluesse Suarez und Chicamocha eine gleichartige Unterfaltung in 3 Antiklinen (Serranieen) und zwei Synklinen auf. Sie wird veranschaulicht durch die zwar flache und wenig ~~gewe~~ untergeteilte Synkline des Suarez und durch die komplexe, Chicamocha Synkline, die durch ~~Alter~~tertiaer hervorgehoben wird (s. Profile No.) Beide Senken lassen sich nach Nordsantander durchverfolgen. - Die Westkordillere weist eine gleichzaehlige Unter- teilung im Norden auf. Ihr oestlicher Arm ist die San Jerónimo Serranie, der nach Westen die Sinú-Senke, die Abibe-Serranie, ~~und~~ die Leon-Senke und die durch eine starke Depression betroffene West- oder Chocó-Serranie folgt, die zur panamensischen Serranie ueberleitet. Tektonisch ^{er} scheint diese durch mindere Laengsglieder untergeteilte Virgationserscheinung komplizierter als erwartet (s. Profil No.)

Das Auftreten von einfachen, den groesseren Falten mehr oder weniger parallelen Klein (Normal-) falten ist schon durch Hettner fuer die Ostkordillere betont worden und hinsichtlich der Morphologie noch besonders hervorgehoben worden. ~~Sie~~ Es ist wohl noch typischer in der Westkordillere und der Kuestenkette, laesst sich aber auch in der Zentralkordillere (morphologisch) und in den geologisch hoeheren Teilen der Senken durchverfolgen.

verlauf von der Ostseite des San Luca Massivs nach der SE Seite des Santa Marta Massivs zeigt und dieses die Gesteine der Zentralkordillere aufweist, so ist es wahrscheinlich, dass das Santa Marta Massiv (5600m?) die direkte Fortsetzung der Zentralkordillere bildet und durch die Banco Depression von ihr getrennt ist. Dem Gesteinscharakter nach zu urteilen bildet die Zentralkordillere oder ein Ast derselben nach der Halbinsel der Goagira und geht von hier aus nach Aruba u. Curacao, wie aus dem Vergleich der Gesteine hervorgeht.
~~sehen Sievers mit dem Martin~~

weist Zusammenfassend kann man sagen, dass von Ekuador bis zur Goagira, die Zentralkordillere die folgenden ~~Klimax~~ Massive und Depressionen aufweist:

- 1) Ekuatorianisches Massiv
- 2) Curacé Depression
- 3) allgemeines ~~Kaxxi~~ Huila-Antioquia Massiv, durch die Quindio-Depression leicht untergeteilt.
- 4) Depression von Remedios
- 5) Massiv von Santa Marta
- 6) Depression von Rio Hacha(?)
- 7) niederes Massiv der Goagira

Die westliche Seite der Zentralkordillere ist steiler als die östliche Seite. Die 2. Prod. besteht aus metamorphem Palaeoz. u. z. T. magis. Allg. die stark von Eruptive durchsetzt sind
Bemerkenswert an der Zentralkordillere ist, dass ihre Westseite schroffer, zerschlossener und schmaeler als die Ostseite ist.
b) Magdalena-Senke.

Diese Senke liegt zwischen der Zentral- und Ostkordillere. Da erstere sich offensichtlich ueber ~~die~~ das Santa Marta Massiv nach der Goagira fortsetzt und ~~der~~ ^{die Westflanke} Westrand der letzteren ^{durch} den Perijá-Ast (Perijá Serranie) gegeben ist, muss man annehmen, dass die geologische Magdalenensenke sich ^{vom nördlichen Magd. Tal} ~~von~~ Cesar-Tal nach Norden ins Cesar Tal fortsetzt und in Richtung des Golfs von Venezuela verläuft. Damit in Uebereinstimmung ^{gleich} steht die Fazies des Mesozoikums zwischen der Gegend Simiti-El Banco ~~mit~~ der des Cesar-Tals. - Im Quellgebiet des Magdalena steigt die Senke zu der Wasserscheide ~~und~~ Schwelle von San Agustin an, deren geologischer Schwellencharakter aus der Arbeit von Grosse ^{aus der Arbeit von Grosse} hervorgeht. Suedlich dieser meist als Verknotung der Ost- und Zentralkordillere aufgefassten Schwelle verschwindet die Magdalenensenke; entwicklungsgeschichtlich mag sie ^{z. T.} durch das ostekuatorianisch-ostperuanische Kreide-Tertiaerbecken gekennzeichnet sein.

Die morphologisch geologische Unterteilung der Senke zwischen dem Quellgebiet des Magdalena und dem Golf von Venezuela ist folgende:

Die 2. Prod. besteht aus metamorphem Palaeoz. u. z. T. magis. Allg. die stark von Eruptive durchsetzt sind
Die 2. Prod. besteht aus metamorphem Palaeoz. u. z. T. magis. Allg. die stark von Eruptive durchsetzt sind
Die 2. Prod. besteht aus metamorphem Palaeoz. u. z. T. magis. Allg. die stark von Eruptive durchsetzt sind

- 1) Schwelle von San Agustín
- 2) unregelmässiges Becken von Neiva
- 3) Enge von Golondrinas
- 4) Becken von El Guamo
- 5) Schwelle (Brücke) von Gualanday
- 6) ? Becken von Honda
- 7) Enge von La Dorada
- 8) Carare Becken
- 9) Enge von Simití
- 10) Cesar Becken
- 11) Schwelle des Rancheria
- 12) ? Paraguahá Becken (Golf von Venezuela)

Bezeichnend fuer die Magdalena Senke ist die Teilung an der Gualanday-Brücke. Suedlich derselben ist das Gelaende huegelig, die Kreide tritt in Innern haeufig in Erscheinung. Noerdlich ist das Gelaende tafelig bis eben und ist breiter, besonders im Carare-Becken.

c) Ostkordillere.

Die Ostkordillere steigt im Sueden am Oberlauf des Caquetá an und verbreitert sich auf der Ostseite gegen Bogotá. Sie weist in diesem Abschnitt verschiedene Massive auf, u.a. das im Quellgebiet des Rio Neiva und das der Zone von Sumapaz, suedlich von der Hauptstadt des Landes. Die maximale Hoehe wird auf dem Sumapaz (4300m) erreicht, dessen Gelaende steil und eingeschnitten nach Osten und unduliert nach Westen abfaellt. In der folgenden Zone von Bogotá sinkt der innere Teil der Ostkordillere zur Hochebene von Bogotá, das geologisch ein Becken ist, ab. Die Hoehe des Plateaus betraegt 2600m. Nach Osten wird es durch das Quetame Massiv begrenzt, waehrend nach Westen die Erosion einen grossen Teil der ursp uenglichen Hoehen abgetragen hat. In NE Richtung steigt die Ostkordillere an und bildet schliesslich zwischen Bucaramanga und Pamplona die Kulmination (4000m) des Massivs von Santander, die hauptsaechlich auf den ~~zentralen~~ ^{inneren} Teil der Kordillere faellt. Nach Norden faellt dies Massiv rasch ab und geht in das Becken von Maracaibo ueber, das im Westen von der Perijá-^{er-}ranie und im Osten vom Mérida-Massiv flankiert wird. Die Einschaltung dieses grossen Beckens wie auch die Depression von San Cristobal, welche das Massiv von Mérida ~~von~~ vom Santander Massiv scheidet, hat Anlass gegeben, das Maracaibo Becken und die Mérida als etwas Verschiedenes von der Ostkordillere anzunehmen. Die Einschaltung des Bogotá-Beckens verweist darauf, dass das Maracaibo Becken eine typische Struktur der Ostkordillere ist; Depressionen wie die von San Cristobal sind allen Kordilleren eigentuemlich.

Der Ostkordillere ist eigentuemlich ~~ihre~~ die rasche Verbreiterung nach Norden, ihr undulierter morphologischer und tektonischer Charakter und der Hinweis auf eine glaeichartige

Magdalena-Senke.

Während Kreide Kreidezeit im Vorland der Anden
als tertiäre Senke

Sie liegt, morphologisch gut ausgeprägt, zwischen der Zentral- u. der Ostkordillere. Im Sueden wird sie durch die Wasserscheide Magdalena-Caquetá anscheinend unterbrochen (Verknötung von Ost- und Zentralkordillere zum Pasto-Knoten im Sinne Humboldts), jedoch zeigen die Untersuchungen Grosses, dass es sich um eine Schwelle der Magdalenenfalten handelt, die im südlichen Departament Huila aufsteigen und dann nach dem oberen Putumayo zu abfallen. Nach den Untersuchungen der amerikanischen Geologen auf der Ostseite der Anden von Ekuador und Perú zu urteilen, setzt die Senke nicht nach Sueden fort sondern geht in das kretazisch-tertiäre ostandine Becken ueber

den die Unterlage des ersten veröffentlichten Heftes. Sehr eingehende palaeontologische Arbeiten, beruhend auf den Sammlungen von H. Goblot, u. R. Valencia Samper, werden z. Zt. von Breistoffer und Mlle. Basse ausgeführt. O. Diétrich hat einen bedeutenden Anteil an der palaeontologischen Kenntnis von Kolumbien. - de Boeckh und Mitarbeiter veröffentlichten Beobachtungen ueber das Napipi-Gebiet in NW Kolumbien, ueber das Silur auf der Ostflanke der Zentralkordillere bei Puerto Berrio und ueber die geologischen Verhaeltnisse zwischen dem Carare-Becken und dem Knoten von Santander. An Hand der vorhandenen Grundlagen entwirft de Cizancourt eine sehr anregende Ansicht ueber die tektonischen Grundlagen des Landes. In gedraengter Uebersicht hat Wheeler die stratigraphischen Verhaeltnisse des Carare-Beckens bekannt gemacht, waehrend Pilsbry die Bestimmung der Süess- und Brackwasserfauna dieses Gebietes ausgeführt hat. Wichtige Hinweise ueber die Geologie von Kolumbien geben King und Notestein in Schucherts Werk ueber die Antillen-Kariben Region. W. Kehler hat zunaechst das Karbon in der Zone des Quetame-Knotens untersucht und daraufhin eine Ammonitenzonengliederung fuer das Grundprofil der Kreide oestlich von Bogotá durchgefuehrt. Verfasser hat speziell die westliche Seite der karibischen Virgation der Westkordillere, d. h. Urabá, weiter den Abschnitt der Cauca-Senke in den Departamenten Cauca und Valle, das obere Magdalental und die Ostkordillere in den Zonen von Cundinamarca, Boyacá und Nordsantander untersucht. Allgemeiner wurde die Kuestenkordillere, die pazifische Senke und die Zentralkordillere (im Suedteil) untersucht.

Durch die genannten Untersuchungen ist eine allgemeine Kenntnis des Orogens ~~gewonnen~~, speziell in der östlich der Kette der Zentral-kordillere gelegenen Hälfte gewonnen. Die grosse Ebene des Ostens scheint zur Hauptsache von Quartaer bedeckt; im südlichen, bewaldeten, tafelligen Gebiet verdanken wir die ersten Kenntnisse den Untersuchungen von v. Bauer. - Diese allgemeine Aufklärung, die insonderheit die Schwierigkeiten der stratigraphischen Verhältnisse im Westen und des ~~Ter~~ limnischen Tertiaers im Innern von Kolumbien aufdeckt, gestattet jetzt speziellen Arbeiten in einem klareren Zusammenhang auszuführen.

Unterteilung wie die der Anden Kolumbiens in 3 Kordilleren und 2 Senken. Die Senken sind morphologisch u. geologisch gut im Tal des Suarez bzw., des Chicamocha ausgeprägt u. lassen sich ~~nach~~ nach Santander weiterverfolgen. Bezeichnend ist, dass das ~~Ab-~~ Ab- u. Aufsteigen des zentralen Hoehenzuges im Inneren der Kordillere die Bildung des Beckens von Bogotá, des Knotens von Santander und der Senke von Maracaibo bedingt.

Als weitere Eigentuemlichkeit der Ostkordillere sei das An- u. Absteigen der Falten an den Flanken erwähnt, z.B. von der Zone von Villeta gegen das Carare-Becken und von der Zone von Medina nach SW.
d) Cauca-Senke.

Die Senke liegt zwischen Zentral- und Westkordillere; sie ist schmaler, hoher und meist auch morphologisch bewegter als die Magdalenensenke. Ihr Verlauf lässt sich morphologisch von dem äquatorialen Teil der Senke verfolgen; die starke Eindeckung mit jungem andesitischen Material lässt die Unterteilung dort nicht erkennen. Im südlichen Kolumbien bildet sie zunächst das geologische, durch die Erosion ausgewaschene Becken des Patia (Grosse), das nach Norden durch die Enge von Mangó mit dem Cali-Becken verbunden ist, das morphologisch eine 1000 m hohe Ebene darstellt. Eine weitere Enge verbindet es mit dem vermutlichen geologischen Becken des Quindio, dessen innerer Teil auf dem westlichen Teil der Quindio-Hochebene (1300 bis 1500 m) liegt. Die Zone von Pereira-Supía ist noch wenig erforscht, doch kann man annehmen, dass dort eine Enge verläuft, die das Quindio-Becken mit dem Fredonia-Becken verbindet. Die Enge von Anzá verbindet letzteres Becken mit dem von Sopetran. - Nach Angaben von Tulio Ospina ueber die Strecke des Cauca-Flusses NE des Sopetran-Beckens muss man annehmen, dass die geologische Cauca-Senke nach Norden in Richtung zum San Jorge-Fluss verläuft, wo sie, unter Zugrundelegung der Profile von Alfred Beck und F.M. Anderson durch die San Jerónimo-Serranie nach Westen begrenzt wird. Aus Andersons Beobachtungen geht auch hervor, dass SW von Ayapel ein Sporn die Senke unterteilt. Die Begrenzung gegen die Zentralkordillere ist zur Zeit kaum festzulegen, da es sich um ein ebenes Gebiet handelt, dessen Untergrund nicht einfach zu beurteilen ist. Die Grenzziehung auf der tektonischen Karte ist als vorläufig zu betrachten, ebenso der Verlauf nach der Mündung des Magdalena.

Während die Grenze gegen die Senke gegen die Westkordillere verhältnismässig einformig ist, treten gegen die Zentralkordillere starke Verbreiterungen und Verschmälerungen ein; erstere ent-

Messur.

"All. Me 302."

Zur Ostsee dem + dem Giron Schicht
Hettner's unternehmend d. D. sein ^{der strat. Posit. mit neuerding s durch} West ^{Notiz bei}
parisische die Chita Gruppe Giron gleich ^{gellert ist.}
genet. Belegende Fossilien bisher nicht
bekannt. Giron nach Notizen distinkt
unter der Kreide. Chita möglicherweise
h. nord. unter vulk. Kreide.

Giron Mächtigen System von rot, ^{v. d.} gelb
Ton sch. set in Kngl. Typische Lokalität
Zone von Giron weltl. In ~~der~~ Bucaramanga
Diese Formation ^{ist} vorbereitet auf dem
Marin von Santander (bei Salar, Pano o
Almoredra, Guatiba u. Labatca. Südlich
unbekannt. In Venezuela den Leguilles von
Erwerb u. old Red von Liddle unternehmend;
Van L. Kehler als Giron bezeichnet. Am West.
rand der Perija von Giron (nach Engstrom)
sich gegen N bis über Breite von Ocaña
ausdehnt und in möglicherweise die rot-
Est. in Kngl. - tuffige Schicht - der
Clear Tals von Sivers umfassend, hier aber
völlig mit merin. Hettner's unternehmend
da Karsten Foss. denen von Caiguera gleich
erwähnt.

Uebersicht der Geologie von Kolumbien.

Die Geologie von Kolumbien ist zu Beginn des vorigen Jahrhunderts durch Humboldts Ansichten ueber die Laengsteilung, Verknotung und Beckenbildungen im gebirgigen Teil sowie durch seine und Degenhardts Fossilsammlungen von allgemeinerem Interesse fuer Europa gewesen. Jedoch wurden ~~seine~~ ^{die} Arbeiten erst zu Beginn der zweiten Haelfte desselben Jahrhunderts von Karsten ^{wieder} aufgenommen, dem die ~~erstmalige richtige~~ Kenntnis der stratigraphischen Grundlagen ~~xxx~~ und die erste rudimentaere Karte von Kolumbien zu danken ist. ~~Sievers~~ Hettner's wertvolle Arbeit ueber die Ostkordillere folgte 1892, vorangegangen von Sievers Beobachtungen ueber das Cesar-Tal und das Schneegebirge von Santa Marta. Reiss u. Stuebel's Sammlungen legten den Grund zu dem ~~Werk von Bergt~~ petrographischen Werk von Bergt ueber die ~~Klasseng~~ Gesteine von Kolumbien u. zu Kuechs Arbeit ueber die vulkanischen Gesteine. 1907 veroeffentlichte Stille seine Beobachtungen ueber die Laengsgliederung von Kolumbien, ^{die der vorliegenden Arbeit als Grundlage dienen,} waehrend 1911 Tulio Ospina entwicklungsgeschichtliche Zusammenhaenge aufdeckte, u. a. die Bedeutung der ~~Anden~~ ^{Zentralkordillere als Achse} der Anden. A. Scheibe, der Begruender der staatlichen geologischen Untersuchungen in Kolumbien, hat besonders den antioquischen Teil der ~~Zentral~~ Anden untersucht u. daneben wichtige Beitrage zur Stratigraphie in der Zone von Bogotá u. am oberen Magdalena bei Girardot geliefert. Eugster behandelte speziell die Tektonik der Ostkordillere und gab sie zuerst in richtiger und uebersichtlicher Weise bekannt. Neben Alfred Beck und Werenfels ^{legte} wirkte F. M. Anderson ~~im Tertiaer von Nordkolumbien~~ ^{legte die Grundl.} die Grundlagen zur Kenntnis des marinen Tertiaers in Nord-Kolumbien. 1926 veroeffentlichte Grosse die erste Einzelkartierung und Einzelbeschreibung eines Teiles von Kolumbien, ~~insbesondere~~ des antioquischen Abschnittes der Cauca-Senke; ihr folgten spezielle Arbeiten ueber das Quellgebiet des Magdalena u. Caquetá, ~~neben~~ u. ueber Mariño. Stutzers Untersuchungen erstrecken sich ueber das obere Cauca-Tal, die Westkordillere bei Cali, ueber die Zentralkordillere, das Magdalental zwischen Girardot u. dem Carare-Becken, ueber die Ostkordillere, das Departament Atlántico und die Goagira. E. A. Scheibes Arbeiten ueber die Ostkordillere werden z. Zt. veroeffentlicht; erschienen ist der Band ueber Ammoniten der Kreide, von Riedel bearbeitet. de Boeckh u. Mitarbeiter veroeffentlichten Beobachtungen ueber das Napipí-Gebiet in NW-Kolumbien u. ueber das Carare Becken u. die Ostkordillere auf der Breite von Bucaramanga. Am Hand der vorhandenen Unterlagen entwirft de Cizancourt seine Ansicht ueber die tektonischen Unterlagen von Kolumbien. In ~~Kurzer~~ gedrueckter Uebersicht ~~geben~~ gibt Wheeler die stratigraphischen Verhael-

Notestein u. King
Verhältnisse des Carare-Beckens bekannt. - Verfasser hat die ~~pazifische~~
pazifische Küstenzone im Norden ~~allgemein~~ u. andere Zonen von Kolum-
bien allgemein, ~~unter~~ und speziell Urabá in NW-Kolumbien, ~~die~~ Cauca-
Senke im Gebiet der Departamente Cauca und Valle, das obere Magdalener-
tal, die Ostkordillere in Cundinamarca, Boyacá und Nordsantander
untersucht.

landgelaende Platz macht, von dem man annehmen kann, dass es zum submarinen, ~~er~~ durch seine einfache Bodengestaltung gekennzeichn-
tes pazifisches Kraton ueberleitet.

*aus dem
Profil No 10*

Die morph. Charakter der Kordillere u. der symm. Charakter der Senken geht
Vom rein morphologischen Standpunkt aus betrachtet, stellt die
Zentralkordillere in diesem Zusammenhang eine Mediane dar, welche
das Orogen symmetrisch zweiteilt und dem gleichfalls symmetrisch
das westliche und oestliche Vorland und darauf das Gondwana und das
Subpazifische Kraton folgen. Dasselbe ^{scheint} ~~ist~~ auch vom tektonischen und
vom entwicklungsgeschichtlichen Standpunkt der Fall zu sein, wie das
auf den folgenden Querprofilen dargestellt ist.

Die Laengsunterteilung beschraenkt sich jedoch nicht auf die
Unterteilung der Grossantikline der Anden in Kordilleren und Senken,
sondern laesst sich ~~wenigstens~~ teilweise ^{direkt} ~~weiter~~ ins Einzelne ver-
folgen. So tritt in der Ostkordillere im Gebiete des Suarez und des
Chicamocha ^{derselben} ~~weitere~~ Unterteilung ^{in 3} ~~in 3~~ Ketten oder
Serranien und zwei ~~Senkungs~~ Senken deutlich in Erscheinung. Das Sua-
rez-Tal ist eine breite, nur leicht gewellte ~~kurze~~ Synklinalen in der
Breite, waehrend das Chicamochatal u. seine SW-Fortsetzung ~~ein~~
~~seine~~ ~~mit~~ durch Tertiaer gekennzeichnete ^(s. Profile 11) ~~Senke darstellt~~. Bei-
de Senken lassen sich geologisch nach Nordsantander verfolgen. - Im
Virgationsgebiet der ~~Ostk~~ Westkordillere ist ^{eine solche} ~~diese~~ Unterteilung
gleichfalls vorhanden und zwar derart, dass auf den oestlichen Fluegel,
(die San Jerónimo Serranie) ~~ein~~ ~~morph~~ die morphologisch gut, aber tek-
tonisch schwach ausgepraegte Senke des Sinú, darauf die Abibe Serranie
~~und~~ die Leon Senke und schliesslich die von einer Depression betrof-
fene westliche Flügel-Serranie folgt, die ueber den unteren Atrato
nach der panamensischen Serranie ueberleitet. - Die weitere Unterteilung
in einfache, nicht weiter untergeteilte Falten ist schon ~~von~~
Hettner fuer die Ostkordillere betont worden und tritt auch morpho-
logisch u. tektonisch in den uebrigen Kordilleren u. Senken, ein ~~schli~~
schliesslich der Kuestenkette auf. ~~In~~ ~~Peru~~, ~~wo~~ ~~die~~ ~~Laengs~~ ~~er~~ ~~streckung~~
~~vermutlich~~ ~~weniger~~ ~~ausgepraegt~~ ~~als~~ ~~in~~ ~~Kolumbien~~ ~~ist~~, ~~ruft~~ ~~si~~ ~~die~~ ~~xxx~~
~~zonare~~ ~~Gliederung~~ ~~her~~ ~~vor~~ ~~(Stappenbeck)~~ ~~her~~ ~~vor~~ ~~xxxx~~

Wie ein Blick auf die Karte lehrt, ist keine der Falten der verschiedenen Groessenordnungen durchgehend. — war laesst sich eine Kordillere, die Westkordillere durch ganz Suedamerika durchverfolgen, aber schliesslich ist auch sie zonar beschraenkt. Die Zentralkordillere laesst sich ~~morphologisch~~ geologisch ~~noch~~ recht gut von Kolumbien bis zum ~~Süd~~rand des bolivischen Hochplateaus durchverfolgen, aber ihre Fortsetzung tritt nicht in Erscheinung. Noch beschraenkter erscheint die Ostkordillere, die ~~nach~~ nach Suedkolumbien abfaellt.

Diese zonare Beschraenktheit der Falten, die fuer Mittel- und Kleinfalten noch staerker in Erscheinung zu treten pflegt fuehrt zu der Frage der Ursachen derselben.

Diesbezuglich verweist schon die Tatsache, dass es keine ~~achsen~~ ~~bestaendigen~~ ueber geringe Entfernungen horizontalachsigen Falten ~~gibt~~ ~~darauf~~, dass ~~kein~~ ~~langes~~ Antiklinen ~~sind~~ sondern nur undulierte, d. h. achsenaufsteigende und -abfallende Falten gibt, darauf, dass es illusorisch ist, ~~sie~~ ^{jene} zu vermuten. Die Undulationen koennen unter Umstaenden stark sein, so stark, dass man ein Verschwinden der betreffenden Falte annimmt, jedoch kann man ~~bestimmte~~ ^{bisweilen} ein Wiederaufsteigen beobachten. ~~Der~~ ~~haeufig~~ ~~tritt~~ ~~dies~~ ~~jedoch~~ ~~nicht~~ ~~ein~~ ^{u. dies deutet auf ein Uebergehen der Falten mit Abbrechung.}

Ebenso wichtig fuer die Beurteilung der Kontinuitaet der Falten ist ~~ihre~~ ~~Assoziations~~ ~~sich~~ ihre Assoziationsstendenz. In neuerer Zeit hat sich der Ausdruck der Antiklinorien und Synklinorien durchgesetzt, der auf Faltenvergesellschaftung ^{beruht} ~~verweist~~. Diese Im Grunde sind die Kordilleren und Serranien nichts anderes als Antiklinorien, die Senken groesserer u. mittlerer Ordnung ~~nichts~~ ~~anderes~~ ~~als~~ Synklinorien, ~~als~~ nach einzelnen Beobachtungen in Kolumbien auch die Kleinfalten, da auch sie im Prinzip untergeteilt zu sein scheinen. In gewissen Faellen ist der Uebergang von Antiklinorien in Synklinorien einfach und auffallend, so z. B. ^{bei dem} das Synklinorium der Guaduassynkline, das streckenweise zu einfacher Synklinform annimmt und bei einem Richtungswechsel in ~~ein~~ das Antiklinorium der tektonischen Gualanday-Bruecke noerdlich von Girardot uebergeht. Dieses Uebergehen von Faltenassoziationen aus dem antiklinen ins Synkline Stadium, ist in Kolumbien besonders einfach dargestellt und zwar in dem Sinne, dass wenn in einem Faltenystem etwa von drei Antiklinen sich z. — die mittlere Falte hebt, sich die seitlichen Antiklinen abschwaechen und die Tendenz zeigen, in der Flanke der mittleren Antikline aufzugehen. Sinkt die mittlere Antikline, so steigen relativ die seitlichen Falten auf. Das Prinzip zeigt den Einfluss der Isostasie und ist auf fig. dargestellt. Es ist in Kolumbien entsprechend den verschiedenen Groessenordnungen der Falten dargestellt, ~~von~~ von grossen bis kleinen Maestab.

COMPAÑIA DE PETROLEO SHELL DE COLOMBIA, BOGOTA

CABLE RECEIVED

From: Shell, Villavicencio

No. 658

Date: 2nd July 1938

Salieron mulas y equipo Mr. Hubach

SHELL

EC.

Falcon (G.)

La Vela: gy, varieg. cl sh w. thin sst, m. l. sst (marine), porous - br La Pta

First Coal Sh & sst 400 feet
 Socorro lign. sh & flossy sst 2500-3000 feet

Amudarya (0)

? H.L.H.
L2m
to is Aquaclore.

Tumbes U. Mioc. 500-		crs Sst, Cgl w. tuff Lyr Large Poca.
Cardalito M. Mioc. 500-		blk, bit Sh, w. Lst nod & Gy tw. top
Zoriba Low. Mioc. 200-+		yl, Co Sst & Cgl Garing. Sh, gy Sh, C, Cgl & gy. Sh
Heath U. Olig. 1000-		blk, bit. Sh, w. Gy yl Lst beds & nodules At top & base Cgl
Mancora M. Olig. 300-450-		mi, pp. c. Sst & Cgl. plocally gy Sh. Pleurocetes, Ampullinopsis
Chira Low. Olig. 400-+		blk, bit Sh w. Sst Lyr & tuff. occur. Lst. Numulites lissoni
Verdon Low. Olig. 600-		Sst & gy Sh Lepidocyclina R. douvillei Cgl (Gy, Qtz & Sh)
Samau U. Eoc. 850		richly G, Sh, Sst & oil Cgl Cardita planicosta, Orthophregma peruviana, Lithyrina
Restina 120-330		Very G Sh & Sst
Parinas 270-300		Sst & Cgl
Pale Greda 600-800-		ly & yl with Sh, little Sst & Cgl Cone in Cone, gy Co.
Salinas 240-		Sst, Cgl & Sh
Yagrit Low. Eoc. 1600-+		thin = Sst Cgl Lyr & Sh & Gy or bl

Middle Eocene

Middle

Mangrove Bolivar Coastal

"Onia" - EL Milagro
see Hedberg
150 - max.

La Villa -
La Puente
150-300-1500-

Zone of br.
friable Sst
40-180-

Zone of mv Sst,
siltst & cl-st.

Zone of l-gr, lam p
mv. siltst, ments
45-110-

Fissile Sh, 120-
w. gr & siltst, f. mgs

La Rosa
Sand

122-
Marine Gr
Claystone

Upper S. Rosa
45 - max

Lower Sta. Barbara
60m max.

La Rosa
230 - max

Aquitana

2.55 - 1/2 br fgr, sft - Sst, pearl siltst
& l br g crs, sft Sst
30 - id. w. siltst, crs-grt Sst of Onia beds
Lignit. ~~Sh.~~, Hornblendite

mtl l bl or lgr p r. clst & lgr, f. crs, sft
Sst

mtl siltst. & cl-st.

transitional

br, friable Sst, no c; loc. absent
lgr, br & lgr siltst & clst, mtl, f. mgs Sst
rarely lgr & lbr silty, Sh. Typical: br,
f. mgs, friable Sst

w. lgr & lgr, mv Sst, f to crs Sst
l bl br clst & siltst (mtl & p y l)
Lignit. lgr silty p g c Sh
main glauconite

w. grt.
siltst
brachist
B

Sh, siltst, siltst, clst, c & Sh

Fissile Sh & lam Sst/Sh, no c
much Magnetite
intergradation (8m)
thin, mgs Sst w. gr & Sh

clstone.

9-18m poorly assort. Sst

2 f m g, & Sh

9-18m fissile Sh, interb. w. mgs Sst
Bolivina common,
- blk-g Sh, brack. B

no Bolivina

grt, fissile
Sh w. f. mgs,
very sft Sst,
grt cl-st,
sft, crs-mgs
thk Sst
Few. blk Sh
cl-ironst go
Prevail. Sst
marine
brack. interc.

Tachira (K)

<p>Oniz = ? Maracaibo 1200- Pliocene</p>		<p>lg, w-g & gr, friable sst, clst psiltst. Some mtl. beds. - Maracaibo w. of Lsst. Transition to unconf.</p>
<p>Hedob. Marac. W. Only La Rosa has good & B. guidance</p>	<p>La Villa 900-1200- M to U. Mioc.</p>	<p>mtl. sst & in wells hardened mtl. cl No sedim. planes No original fauna. E of Maracaibo: Co, pyritic.</p>
	<p>Lasunillas 300-350-450- 900- Lower to H. Mioc.</p>	<p>Transition local unconf. u. part, no fossils, mv. sh. of f. s. lg, gr, sst, siltst, & seams l. part f. m. s. sh. & sh. mi, w. c. 30m glaucon. sst, lam sh, inter. lam. sst, sh conf.</p>
	<p>La Rosa 0-150-180-250 Aquitana</p>	<p>gr, & sh w. subord. lam. sst. y. Ca-sider. nodules & lam. sh. molluscs, & bryoz. conform.</p>
<p>J. C. Douglas bl-wi or wi, occas. lg, mv cl & wi or lg s. siltst. Fossils almost unknown</p>	<p>Tebea 0-50-200. ? U. Olig.</p>	<p>siltst & pelstone, h, mv. occas. coaly, of wi, pale g w. gr, y. & br mtl. Sph. siderite; locally & detritic Eoc. Unconf. on Eoc.</p>
	<p>El Fausto 1800- max ? Olig.</p>	<p>mtl. sediments r, ti, g, g & br hardened sh w. inter. g-gr lam. sh, clstone & gr, fgr sst. little c. Only detritic Cret. Co, brackish p. fresh.</p>
<p>Eocan Volcan. SE. Aguerrevere & G. Zuloaga</p>	<p>Orumo ? U. Eoc. = El Mene</p>	<p>Unconf. from U. Eoc. to pre-Cret. g, sft sh w. subord. friable sst. Inter-lam. sst & sh Co (aren)</p>
<p>Olig. Volc. C. Wiedemann p. 327 T I</p>	<p>Mostrencos 1000-± ? M-Eoc.</p>	<p>conf. heavy min. change lg, then = f. m. sst g, s. sh & sst w. sh inter. mi-c bedding planes. Some lg sst & little c. More c sh in low. part & some Co</p>
	<p>Paso Diablo ± 1000- ? L-M. Eoc.</p>	<p>conf. thk, lg sst prevail. mv, lmy, lg sst, sst w. sh lam. c low part more lmy.</p>
	<p>Guasare 380- ? Paleocen</p>	<p>mv lst & c prevail. & lst w. - sst, g. sst & lg s. sh.</p>

Eocene
Bolivar District (HJH)

Horizon	Thickness	Description
Teotoca Blis.		mv, w. sst & silts, locally - tl.
Zona A Titanite		frissible sh & plast sh, br, T & xl p bl. & silty sh (very similar to Miocene)
Zona B little heavy min.	> 283'	l. lam. sh, c sh, dg, k; second. mi & py. town top sh mas bland & xl intl. C in 1mm beds
Zona C Sidonite garnet staurol. divided - C1 & C2	1700'+	h. lam., dg to blk, c. sh, l. w. fsr. sst. C up to 1mm. Occas. sst up to 1'. Sst soft, friable to h. w. si or ca cement
Zona D	130'	Same as C-Zone.

Mesa Grande
Tash

5 Pedro	Maracaibo 200-960m	Upper Marac. ers little consolid. Cgl derived from Misoa-Trijillo, 9-10m little s & cl.
	subdivisi not practi- cable	Middle Marac. Cgl, strat, sh, mi sst better stratified than u. Marac.
		lower Marac: mbl cl, g-bl, sometimes s. v. orange, xl & dr intl. & s. cl.
Bathysiphon, Bolivi- nopsis, Bulimina, Cassid. Cibicides, Clavulina Dorothia, Globig., Textul. 75-475- Trochant. Uviz. Verneuvillina Valvulina	Mesa Grande 75-475- U. Eoc.	lam. sh & sst, g-bl. Insp Lst reefs w. Orbitoids transitional.
Amob., Bolivina, Bullim. Cibic. Girmb. Textul. Uviz. Verneuvillina	Panji 700- U. Eoc.	mv, lam sh, dg to blk, slightly s & py, w Frequent Ca nodules. Sst only at base of formation in v. part of th. Panji
Famer Panji Haplophrag. Amob.	Misoa-Trij U. Eocene	U. Mis-Tr: 1500-1600- lam sh of Panji type sst, sh sst, s. sh (sst prevails) mv, g. sst low. Mis-Tr - lam, bluish sh more abundant than in v. Mis-Tr. Locally orbit. Lst 100-+

age by
Van de Vlerk

W. Buchivaca
Halm

	U. 2000'		almost entirely mtl cl w. few sst lam.
	Puerbe up to 17000' Lower Puerbe 2300'		wind polished pbl 1000' mtl, mtl sst w. cl-pbl & q-pbl-Lyre 500' c. Spg. lam sh, mtl sh & sst, Gy, mv sst w. little sh, locally c & detrit. c Tow. base q-pbl beds w. feldspar fragm. fresh water w. marine interc.
exting. - two Nit	Cerro Pelado 2800'		shallow - marine, lam, carb. & gy sh w. c up to 11' & s. c lst, mtl little sst.
	Agua Clara Mio-Olig. 2000-3200'		transitional
Coal Form.	Samboris s. facies, E. Hene ? feet		Fgr sst w. w. pale gy, lam, of lign. sh. At base Lyrs of q-pbl, translucent of fe. c sst & sh q. loc. thin c lst beds
	1300' mtl sh w. li		mtl sh w. little li. sil tbt. up to 50' thk At base some 100' of d, lam. sh w. q & thin c
3500' drilled in wells	U. Eocene (Jackson) ? feet		marine sh w. bay, c, s. beds & thin beds of green sh & sst
	Top ure Eocene		dg to blk, uniform ^{fissile} sh w. rare q. horizons horizons. Griff-flye Bruch
	Major Qlat = Hison-Tr.		chiefly q lat w. h. sst, seld L sst plates & d. cryst. lst. 2' strat. lam sh, g pblk, lam, c sh

Cumarebo
G. de F.

Coro G2 500- Plioc. Miocene (At Liddle)		yl, s. cl, crs sst & pudding st
La Vela 600- U. Miocene		impure, egl, s. l. st w. cl yrs, & ostrea } Chiguaje yl, ss cl, impure sst & some cl yrs { gl cl, limy sst, oyster beds } Curazaitr { yl, impure, egl, glauc. p b l st }
Caujaro = Damsite 900- M. Miocene		Cumarebo l. st. mi, ni, porous algal-coral reef l. st 0-100 yl & yl, pp. m. & cl, interc. thin sst w. fenol p b s. l. st -organos. beds w. Metarua (Rim Rock) l. st g cl, fgr, mi, pp. glauc., lent. sst, 17, soft, glauc. b. l. st
Socorro 850- m. Miocene		Dividive l. st. & ff soft fgr - mi, p sst + lam sh p 17 w. tip - B
Carri Pelado ? m. Lower Miocene		Paguate las Lomas EL Tsirup & EL Saladillo C nod. & m. glauc. BM, thk fgr h to soft sst, fa, mi & intruc. g, r with sh.
Solito ? Olig.		Fgr, m h sst w. v. thk (with feldspars)
S. ...		Fgr m h, sst w. Athl. p viol. p r - 11 lam sh

NW Peru Olsson	Upper San Inez	Carmen District	Huancabamba	Falcon Gonzales dist.
Tumbes U. Mioc.	Andes. Beds			
Cardalitos M. Miocene	Lower			
Zorritos L. Miocene	Miocene			
Heath U. Olig.	Canta galto lat Coal Form.			Paracas
Mancora M. olig.	Mixed Beds		Lower	
Chira Low. olig.	Gr. Cgl.		Gyalanday (Miami Sh)	
Verdun Low. olig.	Bnd. Sh.			
Saman U. Eoc.				
Restin			s. Sh.	
Parinas			12-ch Cgl	
Pale Greda				
Salinas				
Negritos				

neuer. b. t. Zyklus.
~~Andere~~

Seit. Kreide verfolgbar, aber wahrsch. früher beginnend.

Pl. u. s. s. Gesamt. Ph. s.
M. u. s. s.

Ob. Eoz. - Olig. Emmerian. Ph. s.
M. Eoz. Guadua - Guadua. s.
U - S. u. s. s.

U - C. u. s. s. - E Geog. - h. s.
U - H. u. s. s. Ph. s.
In v. s. s. Ph. s.
U. s. s.